

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковроди
Природничий факультет
кафедра анатомії та фізіології людини імені Я.Р. Синельникова

Назва курсу	«Сучасна імунологія та основи психосоматики», курс ведеться українською мовою
Викладач (-і)	Іонов Ігор Анатолійович та Галій Алла Іванівна
Профайл викладача	http://anatom.kharkov.ua/team/%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D1%96%D0%B3%D0%BE%D1%80-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87/
Контактний тел.	(099) 07-35-687
E-mail:	ionov.igor2013@gmail.com
Сторінка курсу в CMS UCU	-
Консультації	<i>Очні консультації:</i> 1 година кожен день (з 14-00) на кафедрі анатомії

1. Коротка анотація до курсу - Предмет вивчення навчальної дисципліни «Сучасна імунологія та основи психосоматики» - вивчення сучасних закономірностей функціонування імунної системи людини, механізмів імунної відповіді на різні антигени, механізмів виникнення імуннодефіцитного стану організму та застосування антитіл в біології та медицині

2. Мета та цілі курсу - Метою викладання навчальної дисципліни «Сучасна імунологія та основи психосоматики» є формування у студентів системи знань у вивченні загальних закономірностей розвитку, структури і функціонування імунної системи організму в нормі і при захворюваннях, обумовлених порушенням імунних механізмів .

Основними завданнями вивчення дисципліни «Сучасна імунологія та основи психосоматики» є формування у студентів повного і стійкого уявлення про імунологію як предмет в цілому, уявлення об імунній системі як однієї з важливих систем організму людини; знань про структуру і функції імунної системи людини, її вікових особливостей, клітинно-молекулярні механізми розвитку і функціонування імунної системи, методах імунодіагностики; формування знань про первинні імунодефіцити, ВІЛ-інфекції, СНІД та інших вторинних імунодефіцитних станах; надання сучасних уявлень про причини розвитку і патогенезу хвороб імунної системи, ознайомлення з основними методами дослідження в імунології.

Завданнями навчальної дисципліни є формування відповідних умінь та навичок, а також засвоєння майбутніми педагогами основ біологічної природи імунного захисту людини, її функціональних можливостей для реалізації цих знань в процесі цілеспрямованого санітарного, валеологічного, екологічного, медичного виховання. Засвоєння студентами фундаментальних фізіологічних основ сучасної імунології необхідно для набуття бази для подальшого вивчення дисципліни професійно-педагогічного циклу.

3. Формат курсу - Вкажіть формат проведення курсу:

Очний (*offline*)

4. Результати навчання - Згідно з вимогами освітньої програми студенти повинні:

знати:

- головні історичні етапи розвитку імунології та алергології, предмет і завдання дисципліни, зв'язок з іншими медико-біологічними дисциплінами;
- основні поняття, що використовуються в імунології та алергології;
- структурно-функціональні особливості імунної системи людини;
- розвиток і функціональні властивості основних клітинних елементів імунної системи (Т- і В-лімфоцити, НК-клітини, макрофаги і ін.), їх роль в реакціях вродженого і адаптивного імунітету;
- основні гуморальні фактори імунної системи (антитіла, комплемент, цитокіни, хемокінів і ін.), їх роль в реакціях вродженого і адаптивного імунітету;
- клітинно-молекулярні механізми розвитку і функціонування імунної системи, основні етапи, типи, генетичний контроль імунної відповіді, основні методи імунодіагностики;
- основні види імунних патологій та їх класифікацію;
- вікові особливості імунної системи;
- основи імуногенетики і генетичного контролю імунної відповіді;
- загальні закономірності імунопатогенезу найбільш поширених захворювань людини.

вміти:

- використовувати набуті знання з загальної імунології при вивченні інших медико-біологічних дисциплін;
- користуватися навчальною, науковою, науково-популярною літературою, мережею Інтернет для професійної діяльності;
- правильно інтерпретувати і застосовувати основні поняття імунології при вивченні медико-біологічної літератури;
- знати основи основних реакції імунітету для виявлення антитіл в сироватці хворих при діагностиці інфекційних хвороб.

5. Обсяг курсу

Вид заняття	Загальна кількість годин
лекції	10
семінарські заняття / практичні / лабораторні	16
самостійна робота	49

6. Ознаки курсу:

Рік викладання	семестр	спеціальність	Курс (рік навчання)	Нормативний\ вибірковий
2016	1	014.05 – Біологія та здоров'я людини 091- Біологія	1	Нормативний

- 7. Пререквізити** - Студент повинен прослухати курси фізіологія людини, анатомія людини, цитологія з основами ембріології, молекулярна біологія, біохімія. Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з біології та основ здоров'я, достатніх для сприйняття матеріалу, розуміння джерел та механізмів функціонування організму.

8. Технічне й програмне забезпечення /обладнання – Вивчення курсу не потребує використання програмного забезпечення, крім загально вживаних програм і операційних систем.

9. Політики курсу – Положення про академічну доброчесність ХНПУ імені Г.С. Сковороди: <http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/buhgalteria/polozhennya.pdf>

Очікується, що роботи студентів будуть їх оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань на використані джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в роботу інших студентів становлять, але не обмежують, приклади можливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для її незарахування викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи обману.

Відвідання занять

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі студенти відвідають усі лекції і практичні заняття курсу. Студенти мають інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. Допускається 1 пропуск з поважних причин, який не впливатиме на систему оцінювання. У будь-якому випадку студенти зобов'язані дотримуватися усі строків визначених для виконання усі видів письмових робіт, передбачених курсом.

Література

Уся література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам. Студенти заохочуються до використання також й іншої літератури та джерел, яких немає серед рекомендованих.

10. Схема курсу

Тижд. Дата, год.	Тема, план, короткі тези	Форма діяльності *лекція, самостійна, дискусія, групова робота)	Матеріали	Література, ресурси в інтернеті	Завдання	Вага оцінки	Термін виконання
---------------------------------	-------------------------------------	---	------------------	--	-----------------	------------------------	-----------------------------

<p>07.09.2018</p> <p>2 год</p>	<p>Історія розвитку зарубіжної та вітчизняної імунології.</p> <p>Місце імунології у системі біологічних, медичних, педагогічних, соціологічних і природничих дисциплін. Зв'язок імунології з біологічними та медичними дисциплінами.</p> <p>Імунологія як наука про способи та механізми захисту від генетично чужорідних речовин з метою підтримання гомеостазу організму. Виникнення і становлення імунології як науки, етапи формування імунології. Основні етапи становлення та перспективи розвитку світової та вітчизняної імунології, роль вітчизняних і зарубіжних вчених у розвитку імунології (Едвард Дженнер, Пауль</p>	<p>Лекція/ Дискусія F2F</p>	<p>Історія імунології (ppt)</p>	<p>Сучасна імунологія. Курс лекцій. 2016. –С. 5-12</p>	<p>Прочитати читанку, переглянути презентацію,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Зв'язок імунології з біологічними та медичними дисциплінами. 2. Преспективи розвитку імунології 3. Основні періоди розвитку імунології, як науки. 4. Визначення і загальна характеристика імунітету. 5. Природній (видовий) імунітет. 6. Набутий імунітет. 	<p>Присутність на лекції та активна участь у дискусії –</p> <p>1,5 балів</p>	<p>14.09.2018</p>
--------------------------------	---	-------------------------------------	---------------------------------	--	---	---	-------------------

	<p>Эрлих, Ілля Мечников, Шарль Рише, Жюль Борде, Карл Ландштейнер, Пітер Брайн Медавар, Френк Макфарлейн Бернет, Джордж Снелл, Жан Доссе, Барух Бенасерраф, Родні Портер, Джеральд Едельман, Нільс Ерне, Георг Келлер, Цезарь Мільштейн, Пітер Догерти, Рольф Цинкернагель). Сучасне визначення поняття "іmunітет". Роль іmunної системи в організмі людини, поняття про іmunну систему. Основні функції іmunної системи. Фізіологічні захисні системи організму. Основні напрямки сучасної імунології. Роль імунології в розвитку медицини і біології, її зв'язок з іншими науками.</p>						
<p>07.09.2018 2 год.</p>	<p>Органи і компоненти іmunної системи. Іmunна система як сукупність органів,</p>	<p>Лекція/ Дискусія <i>F2F</i></p>	<p>Органи і компоненти іmunної ситсеми</p>	<p>Сучасна імунологія. Курс лекцій. 2016. –С. 13-19</p>	<p>Прочитати читанку, переглянути презентацію, 1. Основні органи іmunної системи та їх функції</p>	<p>Присутність на лекції та активна</p>	<p>14.09.2018</p>

	<p>тканин і клітин, які здійснюють імунологічні функції. Центральні органи імунної системи: кістковий мозок, вилочкова залоза. Периферичні органи імунної системи: селезінка, лімфатичні вузли і фолікули. Особливості лімфоїдних скупчень, асоційованих із слизовими оболонками в кишечнику, легенів, сечостатевої системи, шкіри і т.д. Вікові особливості імунної системи. Онтогенез і філогенез імунної системи. Подання про стовбурової (родоначальної) кровотворної клітці.</p> <p>Органи і клітини імунної системи. Функціональна організація імунної системи. Філогенез і онтогенез імунної системи. Первинні органи імунної системи</p>		(ppt)		<ol style="list-style-type: none"> 2. Поняття про стовбурові клітини 3. Вторинні органи імунної системи 4. Види імунітету. 5. Характеристика набутого імунітету. 6. Розповсюдження і роль лімфоїдних клітин в організмі тварин та людини. 7. Клітини пам'яті. 8. Відмінності центральної та периферичної імунної системи ссавців та птахів. 	<p>участь у дискусії – 1,5 балів</p>	
--	--	--	-------	--	--	---	--

	<p>(тимус, червоний кістковий мозок). Вторинні органи імунної системи: лімфовузли, селезінка, лімфоїдна тканина, асоційована зі слизовими оболонками, шкіра і епітеліальні тканини. Характеристика клітин імунної системи (лімфоцити, гранулоцити, нормальні (природні) кілери, гранулоцити). Речовини із захисними комплексами (імуноглобуліни). Імунокомпетентні клітини і їх роль в імунній відповіді. Т-клітинна система імунітету: походження, диференціювання Т-лімфоцитів в тимусі; позитивна і негативна селекція тимоцитів. Міграція, круговорот і розподіл Т-лімфоцитів в організмі. Гетерогенність, популяції і субпопуляції</p>					
--	---	--	--	--	--	--

<p>Т-лімфоцитів. Антиген-розпізнають рецептори Т-лімфоцитів і антиген-індукована активація, проліферація і диференціювання різних популяцій Т-лімфоцитів. Молекулярні маркери і рецептори, функціональна активність різних популяцій і субпопуляцій Т-лімфоцитів. Субпопуляції нормальних кіллеров. Система В-лімфоцитів людини: походження, диференціювання В-лімфоцитів в кістковому мозку; міграція, круговорот і розподіл В-лімфоцитів в організмі; рецептори В-лімфоцитів; молекулярні маркери диференціювання і рецептори різних популяцій і субпопуляцій В-лімфоцитів; антиген-індукована активація</p>						
--	--	--	--	--	--	--

	проліферації і диференціювання В-клітин.						
14.09.2018 2 год.	Імунна система як сукупність органів, тканин і клітин, які здійснюють імунологічні функції. Органи і компоненти імунної системи. Функціональна організація імунної системи. Речовини із захисними комплексами (імуноглобуліни). Імунокомпетентні клітини і їх роль в імунній відповіді. Т- та В-клітинна система імунітету: походження, диференціювання.	Практичне заняття; групова робота <i>F2F</i>	Органи і компоненти імунної системи (ppt)	Сучасна імунологія. Курс лекцій. 2016. –С. 13-19	Прочитати читанку, переглянути презентацію, Написання есе на тему: 1. Функціональна організація імунної системи 2. Лейкоцитарна формула та її значення для діагностики захворювань	Присутність на практичному та активна участь у дискусії – 2 бали	21.09.2018
14.09.2018 2 год.	Хімічна будова, функції і класифікація антитіл Хімічна будова молекул імуноглобулінів, роботи Е. фон Беринга і Ш. Китагато. Поняття антитіла. Ланцюги та домени антитіла. Порядок розташування субодиниць в четвертичній структурі	Лекція/ Дискусія <i>F2F</i>	Хімічна будова, функції і класифікація антитіл (ppt)	Сучасна імунологія. Курс лекцій. 2016. –С. 20-31	Прочитати читанку, переглянути презентацію, Написати есе на тему: 1. Функціональні особливості різних доменів імуноглобулінів 2. Особливості взаємодії паротопу та епітопу	Присутність на лекції та активна участь у дискусії – 1,5 балів	21.09.2018

<p>антитіла. Будова шарнирної ділянки. Роботи Р.Портера и Д.Едельмана в плані розуміння того, як структура імуноглобуліну відповідає його функціям. Поняття про паратоп та епітоп, гіперваріабельні ланцюги антитіл. Функції окремих ділянок (доменів) молекули імуноглобулінів:</p> <p>фактична роль доменів C_{H1} и C_L, другого константного домену, функції - C_{H2} и C_{H3} доменів, характеристика та функції важких, легких ланцюгів антитіл.</p> <p>Класифікація і функції окремих класів імуноглобулінів.</p> <p>Функції та особливості будови імуноглобулінів класу G (IgG), імуноглобулінів класу A (IgA), імуноглобулінів класу M (IgM), імуноглобулінів класу E (IgE), імуноглобулінів класу D (IgD).</p>						
---	--	--	--	--	--	--

	<p>Класифікації імуноглобулінів за класами їх в залежності від їх походження. Вікові особливості функціонування та дії основних класів імуноглобулінів.</p> <p>Гетерогенність імуноглобулінів. Ізотипи, аллотипи, ідіотипи.</p> <p>Біологічна активність антитіл різних класів і субкласів. Біосинтез і метаболізм імуноглобулінів.</p> <p>Генетичний контроль синтезу імуноглобулінів і поліморфізмом антитіл.</p>						
<p>21.09.2018</p> <p>2 год.</p>	<p>Неспецифічний (врожений) імунітет, його компоненти та їх функції.</p> <p>Неспецифічні фактори захисту організму. Запалення і його роль в імунній відповіді. Фагоцитарна система. Клітини фагоцитарної системи та фази фагоцитозу. Механізми</p>	<p>Лекція/ Дискусія <i>F2F</i></p>	<p>Неспецифічний імунітет (ppt)</p>	<p>Сучасна імунологія. Курс лекцій. 2016. – С. 32-46</p>	<p>Прочитати читанку, переглянути презентацію, Написати есе на тему:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Імунітет одноклітинних тварин. 2. Явище фагоцитозу. 3. Генетика імунітету. 4. Функціонування класичного шляху активізації комплементу. 5. Функціонування альтернативного шляху 	<p>Присутність на практичному та активна участь у дискусії – 2 бали</p>	<p>28.09.2018</p>

	<p>неспецифічного (вродженого) імунітету. Позаклітинне знищення (цитотоксичність) - макрофаги і нормальні кілери (НК).</p> <p>Система комплементу та її активація, загальні уявлення про систему комплементу. Склад, хімічна природа, локалізація в організмі, основні функції. Альтернативний і класичний шляхи активації комплементу; регуляція системи комплементу.</p> <p>Альтернативний шлях активації комплементу - ефекторний механізм вродженого імунітету. Організація C3-конвертази і C5-конвертази альтернативного шляху. Лектиновий шлях активації комплементу, схожість з класичним шляхом. Неспецифічна активація комплементу</p>				активації комплементу.		
--	---	--	--	--	------------------------	--	--

<p>протеолітичними ферментами. С-реактивний білок і інші білки гострої фази. Походження, імунобіологічна активність, методи дослідження. Класичний шлях активації комплементу. Види імуноглобулінів, що ініціюють класичний шлях. Організація С3-конвертази і С5-ковертази класичного шляху. Формування мембраноатакуючого комплексу, механізм лізису клітини-мішені. Механізми стійкості мікроорганізмів до дії комплементу. Функції системи комплементу. Роль С3 фагоцитів. Біологічна дія продуктів протеолізу С3, С4, С5. Роль С2 В-лімфоцитів. Роль комплементу в активації фолікулярних</p>						
---	--	--	--	--	--	--

	дендритних клітин. Анафілотоксини. Регуляція активності комплементу. DAF, MCP, CR1. C1-інгібітор. Рецептори до C3a і C5a. Білки гострої фази, інтерферони, лізоцим, фібронектин, катіонні білки.						
21.09.2018 2 год.	Хімічна будова молекул імуноглобулінів, ланцюги та домени антитіла.. Функції окремих ділянок (доменів) молекули імуноглобулінів	Практичне заняття; групова робота <i>F2F</i>	Неспецифічний імунітет (ppt)	Сучасна імунологія. Курс лекцій. 2016. –С. 20-31	Прочитати читанку, переглянути презентацію, Написати есе на тему: 1. Функціональні особливості різних доменів імуноглобулінів 2. Особливості взаємодії паротопу та епітопу	Присутність на практичному та активна участь у дискусії – 2 бали	28.09.2018
28.09.2018 4 год.	Характеристика і механізм специфічного (гуморального, лімфоїдного) імунітету Характеристика клітин, що беруть участь в реакціях специфічного імунітету. Механізми реакції антиген-антитіло. Поняття терміна антиген, його загальна будова. Імуногенність ліпідів,	Лекція/ Дискусія <i>F2F</i>	Специфічний імунітет (ppt)	Сучасна імунологія. Курс лекцій. 2016. –С. 47-57	Прочитати читанку, переглянути презентацію, 2 год	Присутність на лекції та активна участь у дискусії – 1,5 балів	28.09.2018

<p>вуглеводів, нуклеїнових кислот і білків. Класифікація антигенів. Характеристика імунних реакцій. Імунологічні феномени, засновані на взаємодії антиген-антитіло: аглютинація, преципітація, лізис, нейтралізація та ін., їх ідентифікація. Взаємодія антитіла з комплементом. Цитотоксична дія антитіл. Антигенні детермінанти, а їх зовнішня поверхня, здатна забезпечувати слабкі хімічні взаємодії з відповідною ділянкою антитіла або рецептора клітини, поняття епітопу. Основні етапи диференціювання Т-клітин в тимусі. Т-клітинний рецептор (TCR). Цитотоксичні Т-лімфоцити (Т-кілери). Основні етапи цитотоксичної дії, механізми цитолізу</p>						
--	--	--	--	--	--	--

	<p>клітин-мішеней. Цитотоксична активність макрофагів. Значення цитотоксичних реакцій в протипухлинному, інфекційному, трансплантаційному імунітет. Розпізнавання МНС-асоційованих пептидів. Роль молекул адгезії (LFA-1, VLA-4) і костимуляторних взаємодій (CD28, CD154) в активації Т-клітин. Вибір варіанту імунної відповіді (Th1 або Th2). Розвиток Т-клітин пам'яті.</p>						
28.09.2018 4 год.	<p>1. Функції та особливості будови імуноглобулінів різних класів. Класифікації імуноглобулінів за класами їх в залежності від їх походження.</p> <p>2. Неспецифічні фактори захисту організму. Запалення і його роль в імунній відповіді.</p>	<p>Практичне заняття; групова робота <i>F2F</i></p>	<p>Будова імуноглобуліні в (ppt)</p> <p>Неспецифічні фактори захисту організму (ppt)</p>	<p>Сучасна імунологія. Курс лекцій. 2016. –С. 20-31</p> <p>Сучасна імунологія. Курс лекцій. 2016. –С. 32-46</p>	<p>Прочитати читанку, переглянути презентацію, 2 год</p>	<p>Присутність на практичному та активна участь у дискусії – 4 бали</p>	05.10.2018

	Фагоцитарна система. Механізми неспецифічного (вродженого) імунітету. Система комплементу та її активація, загальні уявлення про систему комплементу.						
05.10.2018 4 год.	<p>1. Характеристика клітин, що беруть участь в реакціях специфічного імунітету. Механізми реакції антиген-антитіло. Поняття терміна антиген, його загальна будова. Класифікація антигенів. Характеристика імунних реакцій.</p> <p>2. Імунітет до інфекційних хвороб. Поняття природного і штучного імунітету. Природжений антивірусний імунітет. Т- і В-клітинний адаптивний імунітет.</p>	Практичне заняття; групова робота <i>F2F</i>	Неспецифічний імунітет (ppt)	Сучасна імунологія. Курс лекцій. 2016. –С. 47-57	Прочитати читанку, переглянути презентацію, Написати есе на тему: 1. Механізм реакції антиген-антитіло 2. Надати класифікацію антигенів та їх характеристику	Присутність на практичному та активна участь у дискусії – 4 бали	12.10.2018
12.10.2018	1. Імунний статус. Імуннодефіцитний стан. Загальні закономірності	Практичне заняття;	Імунний статус (ppt)	Сучасна імунологія. Курс лекцій. 2016. –С.	Прочитати читанку, переглянути презентацію, Написати есе на тему:	Присутність на практич-	28.09.2018

4 год	функціонування імунної системи. Первинні імуннодефіцитні стани та їх класифікація 2. Поняття про алергію, механізм розвитку алергічних реакцій, причини збільшення алергічних реакцій. Загальна етіологія алергічних захворювань.	групова робота <i>F2F</i>	Поняття про алергію (ppt)	64-71 Сучасна імунологія. Курс лекцій. 2016. –С. 72-83	1. Механізми алергічних реакцій 2. Етіологія алергічних захворювань	норму та активна участь у дискусії – 4 бали	

Література базова:

1. Іонов І.А., Комісова Т.Є., Сукач О.М., Шаповалов С.О. Сучасна імунологія (Курс лекцій для студентів ВНЗ) // Харків.: ЧП Петров В.В., 2017. – 103 с.
2. Іонов І.А., Комісова Т.Є., Сукач А.Н., Шаповалов С.О. Современная иммунология (Курс лекций для студентов ВУЗов) (на русском языке) // Харьков.:ЧП Петров В.В., 2017. – 123 с.
3. Медицинская микробиология, вірусологія і імунологія: учебник для студ. Высш. Мед. Учебн. Заведений: перевод с укр. издания / Андрианова Т.В., Бобырь В.В., Виноград Н.А. и др. под ред. В.П.Широбокова – Винница: Нова книга, 2015. – 865 с.

Допоміжна

1. Ройт А., Бростофф Дж., Мейл . Иммунология. Пер. с англ. // М.:Мир, 2000. – 592 с. с ил.
2. Хайтов Р.М. Иммунология: учебник для студентов медицинских вузов. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. - 320 с.
3. Дранник Г.Н. Клиническая иммунология и аллергология. М.: ООО «Медицинское информационное агентство», 2003.– 604 с.
4. Иммунология (ред. У. Пол), т. 1-3, (пер. англ.) М., 1988.
5. Ярилин А.А. Основы иммунологии. М., 1999. – 511 с.

6. Методы исследования в общей иммунологии: Уч. пособие /Белан Э.Б., Гумилевский Б.Ю.-Волгоград. - 2006.
7. Земсков А.М., Земсков В.М., Караулов А.В. Клиническая иммунология: учебник. - М.: «ГЭОТАР-МЕДИА», 2005.
8. Горячкина Л.А., Кашкина К.П. Клиническая аллергология и иммунология. М.: Миклош, 2009. - 432 с.
- 9.
10. Хаитов Р.М., Ильина Н.И. Аллергология и иммунология. - М.:ГЭОТАР – Медиа, 2009. – 514с.
11. Борисов Л. Б. и др. Руководство к лабораторным занятиям по медицинской микробиологии, вирусологии и иммунологии. - М, Медицина, 1993. – 238 с.
12. Клиническая иммунология и аллергология (ред. Л. Йегер) ,т. 1-3, (пер. нем.) М., 1990.
13. Паттерсон Р. Аллергические болезни. М., 2000.
14. Олехнович В.М. Клиника и терапия неотложных состояний в аллергологии и их профилактика. - М.: Мед. книга, 2005.
15. Стефани Д. В., Вельтищев Ю. В. Иммунология и иммунопатология детского возраста. М. 1996.
16. Клиническая иммунология и аллергология. Под ред. Г.Лолора-младшего, Т. Фишера, Д.Адельмана. – Пер. с англ. – М.:Практика, - 806 с.
17. Пыцкий И. И., Адрианова Н. В., Артмосова А. В. Аллергические болезни, М., 1984.
18. Хаитов Р.М. Клиническая аллергология. – М.: «МЕД-пресс-информ», 2002. – 624 с.
19. Зарецкая Ю.М., Хамаганов Е.Г., Губарев М.И. Иммунология и иммуногенетика человека. М.: Карманная энциклопедия, 2002.
20. Климов В.В. Иммунная система и основные формы иммунопатологии. Ростов-на-Дону:Феникс, 2006.
21. Полетаев А.Б. Клиническая и лабораторная иммунология: лекции. М.: МИА, 2007.
22. Хаитов Р.М., Ильин Н.И. Аллергология и иммунология. Национальное руководство. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009.
23. Чепель Э. Основы клинической иммунологии. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008.
24. Ковальчук Л.В. Иммунология. Практикум. 2010.

13. Інформаційні ресурси

1. <http://www.farmafak.ru/Fiziologiya-1.htm>
2. <http://meduniver.com/Medical/Physiology/>
3. <http://www.bibliotekar.ru/447/>
4. <http://human-physiology.ru/>
5. <http://www.berl.ru/article/biology/fisiology.htm>
6. http://fondknig.com/2009/06/04/lekcii_po_anatomii_i_fiziologii_s_osnovami_patologii_audiokniga.html
7. <http://www.booksmed.com/fiziologiya/page/8/>
8. <http://www.onu.edu.ua/>

9. <http://www.biology.org.ua>

****якщо література подається в скороченому вигляді, то розшифрування подаєте вкінці*

11. Система оцінювання та вимоги

Загальна система оцінювання курсу	<i>Участь в роботі впродовж семестру/екзамен - 60/40</i>
Вимоги до письмової роботи	<i>На кожну контрольну роботу студент повинен підготувати задані теми лекцій, що запропонована для читання (див. календарний план). Оцінюється якість та оригінальність наведених аргументів та самостійні приклади на задану тематику та свої висновки з кожної теми. Контрольна робота (2 за курс) може бути максимально оцінена у 5 балів. Усі повинні обов'язково підготувати всі теми, а відсутність студента з будь-яких причин необ'єктивних причин не може бути виправданям.</i>
Семінарські заняття	<i>Активна робота на кожному практичному занятті оцінюється максимально на 2 бали. За період курсу кожен студент повинен підготувати по 2 самостійних презентації, тему яких він може вибрати разом з викладачем. Максимальна оцінка презентації з її докладом на заняттях оцінюється до 8 балів.</i>
Умови допуску до підсумкового контролю	<i>Всі практичні заняття повинні бути опрацьовані і студент повинен отримати за курс не менш 40 балів, тоді він допускається до здачі іспиту</i>

До Силабусу також готуються матеріали навчально-методичного комплексу:

- 1) Навчальний контент (конспект, розширений план лекцій або презентації)

СУЧАСНА ІМУНОЛОГІЯ

КУРС ЛЕКЦІЙ

(ПРИРОДНИЧИЙ ФАКУЛЬТЕТ)

ЛЕКЦІЯ 1

ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ІМУНОЛОГІЇ

1. Вступ та коротка історія
2. Функції імунної системи

1. Вступ та коротка історія

Наш організм постійно піддається впливу різних хвороботворних чинників навколишнього середовища. У той же час багато людей зберігають здоров'я. Чому ж людина може протистояти шкідливим впливам навколишнього середовища? Що допомагає організму в боротьбі з ними? В процесі біологічної еволюції людини сформувалися системи і механізми, що захищають його як цілісність у випадках, коли фізичні, хімічні або біологічні фактори середовища можуть при взаємодії організму з ними привести до пошкодження будь-яких його структур, що в свою чергу викликає їх патології. Як відомо, при багатьох захворювань людина одужує без втручання медицини, а пошкоджені тканини відновлюються самі по собі. Отже, людський організм здатний захищатися від пошкоджень, боротися з патологією самостійно. У найбільш загальній формі можна виділити наступні типи захисно-приспосувальних механізмів:

1) **морфологічні**: бар'єрні мембрани, огорожувальні захищаються клітини, тканини та органи; проліферація (відновлення) клітин ураженої тканини; гіперплазія, тобто кількісне збільшення клітини або тканини проти норми;

2) **фізіологічні**: активація обмінних процесів, утворення нових медіаторів, ферментів або обмінних циклів і дезактивація існуючих;

3) **імунологічні** системи, спрямовані на захист організму від впливу інших біосистем.

З усіх цих типів захисно-приспосувальних механізмів найбільш важливим є імунна система. Від того, наскільки вона потужна, залежить, буде людина хворіти чи ні. Добре працююча імунна система є найкращим гарантом міцного здоров'я. Хороший імунітет - це основний показник здоров'я, життєвої сили будь-якого живого організму.

Давно було помічено, що людина, котра перенесла небезпечну інфекційну хворобу, вдруге зазвичай нею не захворює. У стародавньому Китаї (близько 590 року до нашої ери), а також в античні часи в Індії був винайдений метод боротьби з важкими випадками віспи. Сутність цього методу полягала в тому, що віспяні скоринки перетирали в порошок і вносили в ніс здоровій людині. Це робилося для того, щоб викликати м'яку форму віспи.

В Європі практику такого захисту від віспи відносять до часу правління короля Англії Георга I, коли дружина британського посла в Константинополі привезла зі Сходу метод введення заразного матеріалу з віспою хворих в вену реципієнтів за допомогою великої голки. Процедура була небезпечною, оскільки часто приводила не тільки до тяжкого захворювання віспою, але і до розвитку інших важких захворювань, зокрема сифілісом і лепри. Проте король Георг I сприйняв це східне нововведення прихильно і навіть дав вказівку виконати подібну процедуру з двома своїми внуками, що сприяло поширенню цього прийому захисту від віспи на Британських

островах. Незважаючи на істотний ризик, люди погоджувалися на дану процедуру, оскільки за часів Георга I з 100 чоловік 60 хворіли віспою і половина з хворих вмирала від хвороби.

У 1738 році лікар з Единбурга Френсіс Хоум застосував такий же принцип для захисту від кору: він переносив з допомогою ватних тампонів матеріал з уражених коровим висипом ділянок шкіри хворих на подряпини на тілі прищеплених, і 7 з 15 підданих такому впливу пацієнтів перехворіли на кір в найменш вираженій формі, отримавши імунітет до цього захворювання на все подальше життя.

Наступним кроком в цьому напрямку стали експерименти Едварда Дженнера (1749-1823). У 1776-1778 роках Дженнер провів направлене зараження декількох своїх пацієнтів матеріалом з віспяних пустул на вимені корів і переконався, що пацієнти дійсно набули імунітет проти натуральної віспи. Результати своїх дослідів по вакцинації (назва була дана від латинської назви корів - *vacca*) він представив до Королівського наукового товариства (1782). На початку досліди Дженнера були піддані критиці, але потім в 1802 році він отримав парламентські субсидії для розвитку віспопрививання і організував спеціальний інститут в Лондоні, після чого воно стало розповсюджуватись по різних країнах: французький імператор Наполеон наказав провести щеплення особовому складу своєї армії, а перший хто отримав щеплення в Росії селянський хлопчик здобув, на честь цієї знаменної події, прізвище вакцини.

Ставало очевидним, що в результаті контакту зі збудником в макроорганізмі з'являються якісь відсутні до цього захисні фактори. Спрямований пошук таких факторів став основним завданням, і в 1890 році в інституті Роберта Коха в Берліні Еміль фон Берінг продемонстрував присутність в крові імунізованих правцевими або дифтерійними бактеріями тварин специфічних білків, названих антитоксинами. Введення сироваток крові таким тваринам - інтактним, ніколи не контактувавшим зі збудниками правця або дифтерії організмам - приводило до появи у останніх вираженої стійкості до даних захворювань. Це було першим науковим, експериментально отриманим доказом вироблення організмом специфічних речовин у відповідь на присутність хвороботворних мікроорганізмів, тому ряд авторів пропонують вважати 1890 рік роком заснування імунології як науки про захисні сили організму.

Надалі детальним вивченням захисних речовин плазми крові почав активно займатися німецький вчений Пауль Ерліх (1854-1915). Детально досліджуючи лікувальні властивості сироваток імунних тварин, він показав, що антитіла (так стали називати відкриті Берінгом антитоксини) відносяться до глобулінової фракції білків плазми крові, що вони здатні передаватися через плаценту з організму матері в організм плоду, який розвивається, що вироблення антитіл відбувається не тільки при контакті з хвороботворними мікроорганізмами або їх токсинами, а й при введенні в кров інших органічних речовин. З досліджень Ерліха випливало, що основу захисту організму від чужорідних агентів визначають розчинені в плазмі крові речовини, і подібного роду погляди до кінця XIX століття отримали назву гуморальної теорії імунітету.

Однак не всі дослідники дотримувалися думки, що захист макроорганізму від інфекції визначається тільки гуморальними факторами. Розпочаті в 1882 році дослідження Іллі Мечникова (1845-1916) вказували на те, що лейкоцити крові ссавців здатні активно поглинати і знищувати хвороботворні мікроорганізми в ході процесу, названого фагоцитозом. Очоливши за пропозицією Луї Пастера

спеціально створену для вивчення фагоцитозу лабораторію в Пастерівському інституті в Парижі, Мечников до початку ХХ століття став основоположником фагоцитарної теорії, або теорії клітинного імунітету.

Подальші дослідження, проведені прихильниками цих теорій, привели до злиття формувалися напрямків, що й знайшло відображення у присудженні Нобелівської премії з фізіології і медицини 1908 року спільно І.І. Мечникову і Паулю Ерліху. Фактично саме ця премія стала визнанням імунології як особливої галузі знань, оскільки Нобелівська премія 1901 року присуджена Емілю фон Берінгу, все-таки була премією медичною - «...за роботи по серотерапії, і перш за все за її використання в боротьбі з діфтерією».

Паралельно з розвитком основної на той період гілки імунології, безпосередньо пов'язаної з інфекційними хворобами, в кінці ХІХ століття були закладені основи двох нових напрямків, умовно відносних до так званої неінфекційної імунології.

Французький дослідник Шарль Ріше (1850-1935), вивчаючи вплив токсичних речовин морських безхребетних на собак, встановив, що організм останніх здатний відповідати на повторне введення невеликих доз токсину надзвичайно бурхливо, що не спостерігалася при першоначальному введенні препарату. Він назвав це явище **анафілаксією** («Зворотною профілактикою»). В ході вивчення з'ясувалося, що випадки небажаних реакцій організмів людей і тварин на профілактичне і терапевтичне введення сироваток, а також алергічні реакції на різні речовини фактично є проявами анафілаксії. Ця робота була удостоєна Нобелівської премії 1913 року.

Ще одна гілка імунології зародилася в ході досліджень, що мають безпосереднє відношення до захисту від інфекційних захворювань. Вивчаючи в кінці ХІХ століття в лабораторії Мечникова в Пастерівському інституті механізми лізису бактерій під впливом білків плазми крові, Жюль Борде (1870-1961) не тільки відкрив (спільно з Пфейффером) систему комплементу, а й виявив, що імунна система здатна реагувати на чужі клітини крові так само, як і на хвороботворні мікроорганізми. І хоча сам Борде отримав Нобелівську премію 1919 року за дослідження комплементу, по суті, продовжуючи його дослідження по імунному відторгненні еритроцитів, Карл Ландштейнер (1868-1943) відкрив групи крові людини, за що в 1930 році був також удостоєний Нобелівської премії.

Крім величезного медичного призначення, що полягає в розробці безпечної системи переливання крові, ця гілка імунології дала докази існування відмінностей конкретних індивідуумів на клітинному рівні і реагування на ці відмінності імунної системи, що багато в чому визначило розвиток імунології в ХХ столітті. Фактично проблема відторгнення пересаджуваних тканин і органів ставала проблемою імунологічною. Пітер Брайан Медавар (1915-1987), який займався спочатку пересадками шкіри, отримав широку відомість саме як імунолог. Роботи Медавар і співробітників стали експериментальним підтвердженням опублікованої в 1949 році загальної теорії імунітету Френка Макфарлейна Бернета (1899-1985), згідно з якою імунна система формується в процесі ембріонального розвитку і саме в цей період організм набуває імунну нечутливість (толерантність) до власних молекул і клітин. За дослідження придбаної імунологічної толерантності обидва дослідника отримали Нобелівську премію 1960 року.

Продовженням досліджень в цьому напрямку стали роботи Джорджа Снелла (1903-1996). У керованих ним дослідженнях було встановлено, що у мишей є 14 систем генів, визначаючих реакції відторгнення при пересадках тканин. Одна з таких груп генів, названа H2-система (від англ. *Hystocompatibility* - тканинна сумісність), виявилася причетною і до розвитку інших імунних реакцій. Жан Досс (1916), досліджуючи антигенні властивості лейкоцитів, виявив існування подібних систем генів у людини і назвав їх HLA (від англ. *Human Leucocytes Antigens* - людські лейкоцитарні антигени). Проведені в різних лабораторіях світу дослідження показали аналогічність H2-системи мишей і HLA-системи людини, і утвердилося уявлення про існування у всіх вищих тварин подібних генетичних систем, які отримали загальну назву «головний комплекс гістосумісності» або скорочено МНС (від англ. *Major Hystocompatibility Complex*). Досліджуючи роль вхідних в комплекс генів, Барух Бенасерраф (1920) і його колеги зуміли встановити причетність продуктів цих генів - специфічних поверхневих молекул клітин вищих організмів не тільки до відторгнення пересаджених тканин, але і до розвитку будь-яких імунних реакцій, в тому числі і призводять до продукції антитіл. Так було започатковано новий напрям в імунології, що отримало назву імуногенетики, а його засновники Снелл, Доссе і Бенасерраф стали лауреатами Нобелівської премії 1980 року.

Тоді ж, в 60-х роках ХХ століття, в основному завдяки роботам Родні Портера (1917-1985) і Джеральда Едельман (1929) вдалося розшифрувати молекулярну структуру антитіл і їх антиген-зв'язуючих центрів, за що ці дослідники отримали Нобелівську премію тисячі дев'яност сімдесят дві року.

Встановлена ще на самому початку розвитку імунології найвища специфічність зв'язування антитіл з викликаючими їх продукцію антигенами, з одного боку, в ХХ столітті набула широкого застосування для очищення та ідентифікації органічних молекул, а з іншого боку, стимулювала дослідження, спрямовані на з'ясування причин настільки величезного розмаїття антитіл і розпізнають антигени клітинних рецепторів. Дві Нобелівські премії 80-х років як раз і відображають ці два напрямки в розвитку імунології в середині другої половини ХХ століття.

Володарями Нобелівської премії 1984 року стали Нільс Ерне (1911-1994), Георг Келлер (1946-1995) і Цезар Мільштейн (1927-2002). Удостоєним такої високої нагороди досягненням цих дослідників було створення методу, який дозволяє отримати суспензії абсолютно однакових по специфічності, так званих моноклональних, антитіл, застосування яких в біологічних і медичних дослідженнях виявилось дуже високоефективним. У той же час прогрес молекулярної біології дозволив Сусуму Тонегави (1936) показати, як генетичні перебудови в хромосомах лейкоцитів забезпечують фантастично багате різноманіття антитіл і антигенраспізнаючих рецепторів, що також було удостоєно в 1987 році Нобелівської премії

Одна з останніх Нобелівських премій ХХ століття за дослідження в області імунології є своєрідним відображенням злиття інфекційної і неінфекційної імунології, оскільки присуджена за дослідження, описуючи роль конкретних молекул у взаємодіях клітин

імунної системи в період розвитку імунних відповідей на антиген. Її володарями в 1996 році стали Пітер Догерті (1940) і Рольф Цинкернагель (1944), які довели участь білків головного комплексу гістосумісності у поданні чужорідних антигенів імунокомпетентним клітинам.

Віхи історії

1798 - Едуард Дженнер (Великобританія) зробив повідомлення про можливість попередження захворювання натуральною віспою шляхом щеплення людям оспенного матеріалу від хворих корів.

1883 - І.І. Мечников (Росія) створив першу експериментально обґрунтовану фагоцитарну теорію імунітету.

1890 - Еміль фон Берінг (Німеччина) запропонував спосіб імунізації антитоксичними сироватками; в 1901 р присуджена перша Нобелівська премія з фізіології або медицини за роботи по сироватковій терапії при лікуванні дифтерії.

1908 - І. Мечников (Росія) і Паул Ерліх (Німеччина) - Нобелівська премія за створення клітинної теорії імунітету.

1913 - Шарль Ріше (Франція) - Нобелівська премія за відкриття анафілаксії (1902).

1919 - Жюль Борде (Бельгія) - Нобелівська премія за відкриття антигенної специфічності.

1960 - Френк М. Бернет (Австралія) і Пітер Медавар (Великобританія) - Нобелівська премія за відкриття штучної імунної толерантності.

1972 - Дж. Едельман (G. Edelman, США) і Р. Портер (R. Porter, Великобританія) - Нобелівська премія за встановлення хімічної будови антитіл.

1980 - Барух Бенасерраф (США), Жан Досс (Франція) і Джордж Снелл (США) - Нобелівська премія за відкриття способу замінювати дефектні гени і створювати нові популяції імунних клітин.

1984 - Н. Эрне (Данія) - Нобелівська премія за створення новаторської теорії «мереж» в імунології.

1984 - Георг Келлер (ФРН) і Цезар Мільштейн (Великобританія-Аргентина) - Нобелівська премія за відкриття і розробку принципів вироблення моноклональних антитіл за допомогою гібридів.

1987 - Сусуму Тонегава (Японія) - Нобелівська премія за відкриття принципу виникнення антитіл (відкриття генів рецепторів Т-лімфоцитів).

1990 - Дж. Маррі і Е. Томас (США) - Нобелівська премія за відкриття в галузі трансплантації органів і клітин при лікуванні захворювань людини.

Рік випуску 1996 - Пітер Догерті (США) і Рольф Цинкернагель (Швейцарія) - Нобелівська премія за відкриття специфічності клітинно-опосередкованої імунного захисту.

1997 - С. Прузінер (США) - Нобелівська премія за відкриття пріонів - нових біологічних принципів інфекцій.

Пріони (англ. Prion від protein - «білок» і infection - «інфекція», слово запропоновано в 1982 році Стенлі Прузінер - особливий клас інфекційних агентів, представлених білками з аномальною третинною структурою і не містять нуклеїнових кислот.

Пріони здатні збільшувати свою чисельність, використовуючи функції живих клітин (в цьому відношенні пріони схожі з вірусами). Пріон - це білок з аномальною тривимірною (третинною) структурою, здатний каталізувати конформаційне перетворення гомологічного йому нормального клітинного білка в собі подібний (пріон). Як правило, при переході білка в пріони стан його α -спіралі перетворюються в β -шари. З'явилися в результаті такого переходу пріони можуть в свою чергу перебудовувати нові молекули білка; таким чином, запускається ланцюгова реакція, в ході якої утворюється величезна кількість неправильно згорнутих молекул. Пріони -

єдині відомі інфекційні агенти, розмноження яких відбувається без участі нуклеїнових кислот. Питання про те, чи вважати пріони формою життя, зараз є відкритим

Всі відомі пріони викликають формування амілоїд - білкових агрегатів, що включають щільно упаковані β -шари. Амілоїди представляють собою фібрили, що ростуть на кінцях, а розлом фібрили призводить до появи чотирьох зростаючих решт. Для розмноження приона необхідно вихідне наявність нормально покладеного клітинного пріонів білка; організми, у яких відсутня нормальна форма пріонів білка, не страждають пріонні захворюваннями

Пріони форма білка надзвичайно стабільна і накопичується в ураженій тканині, викликаючи її пошкодження і, в кінцевому рахунку, відмирання. Стабільність пріонів форми означає, що пріони стійкі до денатурації під дією хімічних і фізичних агентів, тому знищити ці частинки або стримати їх зростання важко. Пріони існують в декількох формах - штамах, кожен зі злегка відмінною структурою.

Пріони викликають захворювання - трансмисивні губчасті енцефалопатії (ТГЕ) у різних ссавців, в тому числі губчасту енцефалопатію великої рогатої худоби (*«коров'ячий сказ»*). У людини пріони викликають хворобу Крейтцфельдта - Якоба, синдром Герстмана - Штраусслера - Шейнкера, фатальну сімейну безсоння. Всі відомі пріонні захворювання вражають головний мозок і інші нервові тканини, в даний час невиліковні і в кінцевому підсумку смертельні.

Імунітет (від лат. *Immunitas* - «позбавлення», «звільнення від чого-небудь») - це несприйнятливність організму до різних інфекційних агентів, а також продуктів їх життєдіяльності, речовин і тканин, які мають чужорідними антигенними властивостями (наприклад, отрут тваринного та рослинного походження). Одного разу перехворівши, наш організм запам'ятовує збудника хвороби, тому наступного разу захворювання протікає швидше і без ускладнень. Але часто після тривалих захворювань, оперативних втручань, при несприятливій екологічній обстановці і в стані стресу імунна система може давати збої.

Традиційно під поняттям імунітету розуміли несприйнятливність багатоклітинного організму до інфекційних захворювань. Це властивість забезпечується багатьма системами живого організму. Наприклад, шкіра, епітелій дихальних шляхів, слизова оболонка травного каналу завдяки їх механічній цілісності є непроникними для мікроорганізмів. Захисну функцію виконують також хімічно активні середовища - соляна кислота шлункового соку, нормальна мікрофлора кишок. Однак головну роль у захисті макроорганізму від інфекції відіграє система крові. Ще в минулому столітті було відкрито явище фагоцитозу і створена клітинна теорія імунітету (І. Мечников). Тоді ж були виявлені протимікробні властивості плазми крові, що дало початок гуморальної теорії імунітету (П. Ерліх). Сучасна імунологія визнає рівноправне існування обох механізмів імунітету. Кожен з них може бути як специфічним, так і неспецифічним.

Все сказане вище про імунітет і його механізми призвело до перегляду питання про роль імунітету в організмі. Захисна роль імунітету по відношенню до патогенних мікроорганізмів і їх токсинів є безсумнівною. Однак як пояснити відторгнення пересаджених гомологічних органів або еритроцитів несумісною групи крові того ж виду? Адже ці органи і клітини не містять токсинів, не несуть загрози макроорганізму, навпаки, вони рятують цей організм від загибелі. Відповідь на ці питання дає сучасна імунологія, яка за останні десятиліття радикально змінила своє утримання і розширила сферу інтересів. В даний час поняття імунітету означає здатність організму розпізнавати і знищувати чуже. При цьому під чужим розуміють не тільки патогенні мікроорганізми, токсини, перелита кров або трансплантат, а й мутантні клітини свого ж організму. Як би рідко не траплялися спонтанні мутації, макроорганізм, які складаються з 10¹³ клітин, значна частина яких постійно ділиться, може мати близько 10 млн мутантних клітин зі зміненим

геномом. Деякі з них виявляються життєздатними і в процесі подальшого поділу утворюють тканину зі зміненою, невластивою організму функцією, що може привести до загибелі макроорганізму.

Таким чином, **імунітет - це система захисних реакцій організму, спрямованих на підтримку генетичної сталості індивідуума.** Що стосується трансплантаційного імунітету, то він є зворотним і вкрай небажаним аспектом цього процесу, з яким доводиться боротися заради порятунку життя людини.

2. Функції імунної системи

Імунна система, поряд з іншими регуляторними системами - нервової та ендокринної, грає важливу роль в підтримці сталості внутрішнього середовища організму і забезпеченні його адаптації до постійно змінюваних умов довкілля. На відміну від нервової і ендокринної систем, контролюючих кількісний гомеостаз, імунна система охороняє якісне сталість клітинного і гуморального складу організму.

Імуна система забезпечує:

1. Захист організму від впровадження чужорідних клітин і від що виникли в організмі модифікованих клітин (наприклад, злоякісних);
2. Знищення старих, дефектних і пошкоджених власних клітин, а також клітинних елементів, не характерних для даної фази розвитку організму.
3. Нейтралізацію з подальшим видаленням всіх генетично чужорідних для даного організму високомолекулярних речовин біологічного походження (білків, полісахаридів, ліпополісахаридів і т. Д.).
4. Продукцію різноманітних біологічно активних молекул, від найпростіших до дуже складних, що володіють широким спектром ефектів і, на відміну від гормонів, підтримують не гомеостаз а складну реакцію всього організму на впровадження чужорідних клітин, вірусів, імунне ушкодження, а також запалення, репарацію і регенерацію (цитокінів, ростових факторів, медіаторів запалення і т. д.).
5. Залучення для оптимізації реалізованих нею захисних реакцій нервової і ендокринної систем.

Імунокомпетентні клітини і продукують ними фактори, крім захисної, можуть виконувати в організмі інші функції. Відомо, що лімфоцити беруть участь ***у кишковому травленні за рахунок великого запасу міститься в них ліпази, беруть участь в утворенні білків плазми крові, здійснюють транспорт ДНК*** до тканин.

ЛЕКЦІЯ 2

ОРГАНИ І КОМПОНЕНТИ ІМУННОЇ СИСТЕМИ

1. Первинні органи імунної системи (тимус, червоний кістковий мозок)
2. Вторичні органи імунної системи
 - 2.1. лімфовузли
 - 2.2. селезінка
 - 2.3. Лімфоїдна тканина, асоційована зі слизовими оболонками.
 - 2.4. Шкіра і епітеліальні тканини
3. Характеристика клітин імунної системи
 - 3.1. лімфоцити
 - 3.2. Нормальні (природні) кілери
 - 3.3. гранулоцити
4. Речовини із захисними комплексами (імуноглобуліни)

1. Первинні органи імунної системи (тимус, червоний кістковий мозок)

Існує своєрідна ієрархія органів імунної системи. Вони діляться на **первинні** (де лімфоцити утворюються) і **вторинні** (де вони функціонують). Всі ці органи пов'язані між собою і з іншими тканинами організму за допомогою кровоносних лімфатичних судин, по яких пересуваються лейкоцити.

Первинними органами є **тимус** (вилочкова залоза) і **бурса** (у птахів), а також **червоний кістковий мозок** (можливо, і **апендикс**) у людини: звідси Т- і В-лімфоцити відповідно. «Навчання» направлено на придбання здатності диференціювати своє від чужого (розпізнавати антигени). Щоб впізнали, клітини організму синтезують спеціальні білки.

До **вторинних** лімфоїдних органів належать **селезінка, лімфатичні вузли, аденоїди, мигдалики, апендикс, периферичні лімфатичні фолікули**. У вторинних лімфоїдних органах і відбувається розвиток імунної реакції на антиген. Прикладом може служити різке збільшення лімфатичних вузлів близько ураженого органу при запальних захворюваннях. Лімфоїдні органи на перший погляд здаються невеликою системою організму, але було підраховано, що в сумі їх маса становить понад 2,5 кг (що, наприклад, більше маси печінки).

В кістковому мозку зі стовбурної клітини-попередниці (родоначальниці всіх клітин крові) утворюються клітини імунної системи. Там же проходять диференціювання В-лімфоцити. Перетворення стовбурової клітини в В-лімфоцит відбувається в кістковому мозку. Кістковий мозок являє собою одне з основних місць синтезу антитіл. Наприклад, у дорослій миші в кістковому мозку знаходиться до 80% клітин, що синтезують імуноглобуліни. Відновити імунну систему у смертельно опромінених тварин можна за допомогою внутрішньовенного введення клітин кісткового мозку.

Тимус (вилочкова залоза)

Тимус розташовується безпосередньо за грудиною. Він формується раніше за інших органів імунної системи (вже на 6-му тижні вагітності), але вже до 15 років він зазнає зворотний розвиток, у дорослих відбувається майже повне заміщення його жировою клітковиною. Проникаючи з кісткового мозку в тимус, стовбурова клітина під впливом гормонів перетворюється спочатку в так званий **тімоцит** (клітку - попередницю Т-лімфоцити), а потім, проникаючи в селезінку або лімфатичні вузли, перетворюється в зрілий, імунологічно активний Т-лімфоцит. Велика частина Т-лімфоцитів стає так званими Т-кілерами (вбивцями). Менша частина виконує регуляторну функцію: Т-хелпери (помічники) підсилюють імунологічну реактивність, Т-супресори (подавителі), навпаки, знижують її. На відміну від В-лімфоцитів Т-лімфоцити (в основному Т-хелпери) за допомогою своїх рецепторів здатні розпізнавати не просто чуже, але і змінене своє. У вилочкової залозі поряд з утворенням Т-лімфоцитів продукуються *тимозин і тимопоетин* - гормони, що забезпечують диференціювання Т-лімфоцитів і грають певну роль в клітинних імунних реакціях.

2. Вторинні органи імунної системи

2.1. Лімфовузли

Лімфовузли - це периферичні органи імунної системи, які розташовані по ходу лімфатичних судин. Основні функції - це затримання і запобігання поширенню антигенів, що здійснюється за рахунок Т-лімфоцитів і В-лімфоцитів. Вони є своєрідним фільтром для мікроорганізмів, які переносять лімфою. Мікроорганізми проходять через шкіру або слизові оболонки, потрапляють в лімфатичні судини. За ним вони проникають в лімфатичні вузли, де затримуються і знищуються. Функції лімфатичних вузлів:

- 1) **бар'єрна** – они первыми реагируют на контакт с повреждающим агентом;
- 2) **фльтраційна** – в них здійснюється затримка проникаючих з струмом лімфи мікробів, сторонніх часток, пухлинних клітин;
- 3) **іmunна** – пов'язана з виробленням в лімфатичних вузлах імуноглобулінів і лімфоцитів;
- 4) **синтетична** – синтез спеціального лейкоцитарного чинника, який стимулює розмноження клітин крові;
- 5) **обменная** – лімфатичні вузли беруть участь в обміні жирів, білків, вуглеводів і вітамінів.

2.2. Селезінка

Селезінка має будову, близьке до будови вилочкової залози. У селезінці утворюються гормоноподобні речовини, які беруть участь в регуляції діяльності макрофагів, здійснюється синтез імуноглобулінів класів М і J. Крім того, тут відбувається фагоцитоз пошкоджених і старих еритроцитів, чужорідних для організму речовин, пошкоджених клітин крові, фарбувальних з'єднань і чужорідних білків.

2.3. Лімфоїдна тканина, асоційована зі слизовими оболонками

Даний вид лімфоїдної тканини розташовується під слизовою оболонкою. Сюди відносяться **апендикс, лимфоїдне кільце, лімфатичні фолікули кишечника, а також аденоїди**. Скупчення лімфоїдної тканини в кишечнику - Пейєрових бляшки. Ця лімфоїдна тканина є бар'єром на шляху проникнення мікробів через слизові оболонки.

2.4. Шкіра і епітеліальні тканини

Сукупність мікроорганізмів, які населяють шкіру і слизові оболонки здорової людини, є нормальною мікрофлорою. Ці мікроби мають здатність протистояти захисним механізмам самого організму, але вони не здатні проникати в тканини. Великий вплив на інтенсивність імунної відповіді в органах травлення надає нормальна мікрофлора кишечника. Нормальна мікрофлора пригнічує розвиток хвороботворної. Наприклад, у жінки нормальна мікрофлора піхви представлена молочнокислими бактеріями, які в процесі життєдіяльності створюють кисле середовище, що перешкоджає розвитку патогенної мікрофлори.

Внутрішнє середовище нашого організму відмежована від зовнішнього світу шкірою та слизовими оболонками. Саме вони є механічним бар'єром. У епітеліальній тканині (вона знаходиться в шкірі і слизових оболонках) клітини дуже міцно пов'язані між собою міжклітинних контактів. Це перешкода подолати нелегко. Миготливий епітелій дихальних шляхів видаляє бактерії і частинки пилу завдяки коливанню війок. У шкірі є сальні і потові залози. В поті містяться молочна і жирні кислоти. Вони знижують рН шкіри, загартовують її. Гальмують розмноження бактерій перекис водню, аміак, сечовина, жовчні пігменти, що містяться в поті. Слізна, слинна, шлункові, кишкові та інші залози, чий секрет виділяється на поверхню слизових оболонок, інтенсивно борються з мікробами. По-перше, вони просто їх змивають. По-друге, деякі рідини, секретуються внутрішніми залозами, мають такий рН, який пошкоджує або руйнує бактерії (наприклад, шлунковий сік). По-третє, в слинній і слізній рідинах міститься фермент лізоцим, який безпосередньо і руйнує бактерії.

3. Характеристика клітин імунної системи

А тепер зупинимося докладніше на розгляді клітин, що забезпечують злагоджену роботу імунітету. Безпосередніми виконавцями імунних реакцій є лейкоцити або імунокомпетентні клітини. Їх призначення - розпізнавати чужорідні речовини і мікроорганізми, здійснювати боротьбу з ними, а також фіксувати інформацію про них.

Зрілі лейкоцити об'єднують **п'ять популяцій клітин** (рис. 1.1) лімфоцити (Т-кілери, Т-хелпери, Т-супресори, В-лімфоцити);

2) нейтрофіли (паличкоядерні і сегментоядерні);

3) еозинофіли;

4) базофіли;

5) моноцити.

Імунокомпетентні клітини можна виявити практично в будь-якій частині організму, проте сконцентровані вони переважно в місцях своєї освіти - первинних і вторинних лімфоїдних органах.

Первинним місцем освіти всіх цих клітин є орган кровотворення - *червоний костний мозок*, де утворюються і проходять повний цикл диференціювання моноцити і все гранулоцити (нейтрофіли, еозинофіли, базофіли). Тут же починається диференціювання лімфоцитів. Всі лейкоцити походять від єдиної кістковомозковою полипотентної стовбурової кровотворної клітини.




Рис. 1. Основні елементи імунної системи

3.1. Лімфоцити – головні фігури в імунологічному нагляді. В кістковому мозку попередники лімфоцитів поділяються на дві великі гілки. Одна з них (у ссавців) закінчує свій розвиток в кістковому мозку, а у птахів - у спеціалізованому лимфоїдному органі - бурсі (сумці) (рис. 2). Це В-лімфоцити. Після того як В-лімфоцити залишають кістковий мозок, вони короткий час циркулюють в кров'яному руслі, а потім відбувається впровадження їх в периферичні органи. Вони ніби поспішають здійснити своє призначення, оскільки термін життя цих лімфоцитів невеликий - всього 7-10 днів. Різноманітність В-лімфоцитів формується вже під час внутрішньоутробного розвитку, причому кожен з них спрямований проти певного антигену.

Інша частина лімфоцитів з кісткового мозку переселяється в тимус, центральний орган імунної системи. Ця гілка - Т-лімфоцити. Після завершення розвитку в тимусі частина зрілих Т-лімфоцитів продовжує перебувати в мозковому шарі, а частина залишає його. Значна частина Т-лімфоцитів стає Т-кілерами, менша частина виконує регуляторну функцію: Т-хелпери підсилюють імунологічну реактивність, а Т-супресори, навпаки, послаблюють її. Хелпери здатні впізнавати антиген і активізувати відповідний В-лімфоцит (безпосередньо при контакті або на відстані за допомогою спеціальних речовин - **лімфокінів**). Найбільш відомим лімфокіном є інтерферон, який застосовується в медицині при лікуванні вірусних хвороб (наприклад, грипу), але він ефективний тільки на початковому етапі виникнення захворювання.




Рис. 2. Схема освіти Т- і В-лімфоцитів і їх участь в клітинному і гуморального імунітету

Супресори мають здатність вимикати імунну відповідь, що дуже важливо: якщо імунна система не буде подавлена після знешкодження антигену, складові частини імунітету поїдять власні здорові клітини організму, що призведе до розвитку аутоімунних захворювань. Кілери є головною ланкою клітинного імунітету, так як вони розпізнають антигени і ефективно їх вражають. Кілери виступають проти клітин, які вражені вірусними інфекціями, а також пухлинних, мутованих, старіючих клітин організму.

3.2. Принципово відрізняється від них особлива субпопуляція лімфоцитів - **нормальні (природні) кілери (НК)**. НК є цитотоксичними клітинами, здійснюють руйнування клітин-мішеней (головним чином, пухлинних клітин і клітин, заражених вірусами) без попередньої імунізації, тобто за відсутності антитіл. К-клітини способны руйнувати клітини-мішені, покриті невеликою кількістю антитіл.

Після дозрівання імунокомпетентні клітини виходять в кровотік, за яким моноцити і гранулоцити мігрують в тканини, а лімфоцити спрямовуються у вторинні лімфоїдні органи, де відбувається антигензависимая фаза їх диференціювання. Кровоносна система - основна магістраль транспорту і рециркуляції імунних компонентів, в тому числі імунокомпетентних клітин. У крові, як правило, не відбувається ніяких імунологічних реакцій, кровотік тільки доставляє клітини до місця їх функціонування.

3.3. Гранулоцити (Нейтрофіли, еозинофіли, базофіли) після дозрівання в кістковому мозку виконують лише ефекторну, тобто робочу, функцію, після однократного виконання якої вони гинуть.

Ядра зрілих нейтрофілів сегментовані, т. Е. Мають перетяжки (тому їх називають сегменто), ядра незрілих клітин називають палочкоядерним. Одна з назв нейтрофілів (мікрофагоцити) вказує на їх можливість фагоцитировать мікроорганізми, але в менших кількостях, ніж це роблять макрофаги. Нейтрофіли захищають від проникнення в організм бактерій, грибів і найпростіших. Ці клітини ліквідують загиблі клітини тканин, видаляють старі еритроцити і очищають поверхню рани. При оцінці розгорнутого аналізу крові ознакою запального процесу є зрушення лейкоцитарної формули вліво зі збільшенням числа нейтрофілів.

У вторичних лімфоїдних органах лімфоцити, де основною їх функцією є розмноження у відповідь на антигенний стимул з появою короткоживучих специфічних ефекторних клітин і клітин, які довго пам'яті. **Імунологічна пам'ять** - здатність організму відповідати на повторне введення антигену імунною реакцією, характерна більшою силою і більш швидкою відповіддю, ніж на першу імунізацію.

У вторинних лімфоїдних органах Т- і В-лімфоцити вперше контактують з чужорідними для організму антигенами. Такий контакт здійснюється переважно в лімфоїдній тканини, за місцем надходження антигену. Після контакту відбувається розмноження клонів (**від грецького - паросток,отпрыск**) Т- і В-клітин, специфічних до данного антигену, і диференціювання їх в кінцеві ефекторні короткоживучі (Т-ефектори з Т-лімфоцитів і плазматичні клітини з В- лімфоцитів). Частина Т- і В-лімфоцитів перетворюється в клітини імунологічної пам'яті. Останні частково мігрують в інші вторинні лімфоїдні органи, в результаті чого в них виникає підвищений рівень лімфоцитів, специфічних до антигену, атаці якого організм піддався хоча б один раз. Завдяки цьому створюється імунологічна пам'ять на конкретний антиген у всій імунній системі.

Надходження лімфоцитів з кровотоку у вторинні лімфоїдні органи жорстко контролюється. Істотна частина зрілих Т- і В-лімфоцитів постійно циркулює в кровотоці між лімфоїдними органами (так називаємої рециркулюючі лімфоцити)

Функціональне призначення рециркуляції лімфоцитів полягає в здійсненні постійного «імунного нагляду» тканин організму імунокомпетентними лімфоцитами, в ефективному виявленні чужорідних і змінних власних антигенів і постачанні органів лімфоцитопоеза інформацією про появу антигенів в різних тканинах. Розрізняють **швидку рециркуляцію** (здійснюється протягом декількох годин) і **повільну** (триває неділями). В ході **швидкої рециркуляції** лімфоцити крові зв'язуються з венулами і далі мігрують в лімфатичні судини і через грудну лімфатичну протоку повертаються в кров. Цим шляхом мігрує близько 90% лімфоцитів. При **повільній рециркуляції** лімфоцити крові мігрують через венули в різні периферичні тканини, потім потрапляють в лімфатичні судини і вузли і знову в кров. Таким шляхом рециркулює приблизно 5-10% лімфоцитів. Серед рециркулює лімфоцитів більшою швидкістю міграції мають Т-лімфоцити і клітини імунологічної пам'яті обох типів.

Безпосередню участь в імунному захисті беруть також клітини шкірного і слизового покрыву, що створюють **механічний бар'єр** на шляху чужерідного антигену. В якості механічних факторів неспецифічних захисних механізмів можна розглядати злущування клітин поверхневих шарів багатшарових епітеліїв, вироблення слизу, що покриває слизові оболонки, биття війок, що здійснює транспорт слизу по поверхні епітелію (в респіраторному тракті). Мікроби видаляються з поверхні епітелієм також струмом слини, слизу, сечі та інших рідин.

У здійсненні захисту організму від впровадження чужорідних клітин уча-твуют **клітини, які синтезують різноманітні імунологічно активні речовини** (наприклад, клітини сальних залоз виробляють **жирні кислоти**, клітини потових залоз - **молочну кислоту**, низьке значення рН якої забезпечує антимікробну дію). У багатьох секретах, що продукуються клітинами організму, містяться бактерицидні компоненти, такі як **соляна кислота** в шлунковому соку, **спермін і цинк в спермі**, **лактопероксидаза** в молоці, **лізоцим** в слюзах, носових виділеннях і слині. Відомий також **механізм мікробного антагонізму**, сутність якого полягає в тому, що нормальна

бактеріальна флора людини може пригнічувати ріст багатьох потенційно патогенних мікроорганізмів і грибів внаслідок конкуренції за необхідні поживні речовини.

4. Речовини із захисними комплектами (імуноглобуліни)

До *гуморальних імунних компонентів* відносяться найрізноманітніші імунологічно активні молекули, від простих до дуже складних, котрі продукуються імунокомпетентними і іншими клітинами і беруть участь в захисті організму від чужорідного або свого дефектного. Серед них, перш за все, слід виділити речовини білкової природи - імуноглобуліни, цитокіни, систему компонентів комплементу, інтерферон та інші. До імунним компонентів відносяться інгібітори ферментів, подавляючі ферментативну активність бактерій, інгібітори вірусів, численні низькомолекулярні речовини, які є медіаторами імунних реакцій (гістамін, серотонін, простагландини та інші).

ЛЕКЦІЯ 3-4

ХІМІЧНА БУДОВА, ФУНКЦІЇ І КЛАСИФІКАЦІЯ АНТИТІЛ


1. Хімічна будова молекул імуноглобулінів
2. Функції окремих ділянок (доменів) молекули імуноглобулінів.
3. Класифікація і функції окремих класів імуноглобулінів.
 - 3.1. Імуноглобуліни класу G (IgG)
 - 3.2. Імуноглобуліни класу A (IgA)
 - 3.3. Імуноглобуліни класу M (IgM)
 - 3.4. Імуноглобуліни класу E (IgE)
 - 3.5. Імуноглобуліни класу D (IgD)

1. Хімічна будова молекул імуноглобулінів

Подання про антитіла і викликають їх продукцію антигени почало формуватися в кінці XIX століття. Основоположними стали проведені в 1890 році дослідження Е. фон Берінга і Ш. Кітазато, які довели наявність в плазмі крові ссавців особливих ве-вин, здатних нейтралізувати згубну дію токсинів бактерій. Такі речовини були відсутні в крові спочатку і з'являлися в організмі як відповідь на дію токсину. Подальші дослідження показали, що подібна відповідь можуть викликати різні вводяться в кров агенти, причому з'являються в крові речовини володіють специфічністю, т. Е. Взаємодіють тільки з агентом, що викликав відповідь. Стало зрозуміло, що запропонований Берінгом і Кітазато термін «антитоксинів» занадто вузький, і його замінили на термін «антитіла». Так сформувалося уявлення про антитіла як про речовини, що забезпечують захист від дії чужорідного агента, і антигени як чужорідних агентів, викликаючих утворення антитіл.

Однак про хімічну природу антитіл стало відомо лише в середині XX століття. У 1937 році Х. Тізеліус і У. Кабатов із застосуванням методу електрофорезу вдалося встановити приналежність антитіл до гамма-глобулінової фракції плазми крові, що і призвело до появи терміну «імуноглобуліни». Детально структуру імуноглобулінів вивчили в кінці 50 - середині 60 років в лабораторіях Р. Портера і Д. Едельман. У ці ж роки в цитологічних дослідженнях було показано, що дані молекули секретуються в плазму В-клітинами крові. Це дозволило сформулювати нинішнє уявлення про антитіла (імуноглобуліни), як про продукуються В-лімфоцитами глікопротеїну гамма-глобулінової фракції плазми крові вищих тварин і людини, здатних специфічно взаємодіяти з викликов їх продукцію антигеном.

Функціональна молекула імуноглобуліну являє собою білок в четвертинній структурі, утворений 4 поліпептидними ланцюгами (рис. 3). Дві з них прийнято називати легкими і позначати буквою L (від англ. Light - легкий), дві інші - важкими або H-ланцюгами (від англ. Heavy - важкий). Легкі ланцюги мають невелику масу (близько 25kD), і кількість амінокислотних залишків в них коливається в межах від 210 до 220. Важкі ланцюги як мінімум в два рази важче легких, і протяжність їх (залежно від класу) - від 440 до 550 амінокислотних залишків .



Мал. 3. Загальна схема будови імуноглобулінів (Песнякевич А.Г., 2007)

Всі ланцюга мають доменну структуру. Протяжність одного домену в середньому близько 110 амінокислотних залишків, приблизно 60 з них утворюють скріплену ковалентними S-S-зв'язками глобулярну частину домену. У легких ланцюгах таких доменів завжди два, у важких - 4 або 5. Домени прийнято нумерувати починаючи від NH₂-решт поліпептидної ланцюга. І в легких і в важких ланцюгах перший

домен позначається латинською буквою V (від англ. Variable - варіабельний), наступні - латинською літерою C (від англ. Constant - константних, постійний). Для позначення приналежності домену до певного ланцюга і положення домену в ній використовується правий нижній підрядковий індекс. Наприклад, варіа-кабельної домен легкого ланцюга позначається як VL, а другий константний домен важкої - як CH2.

На константних доменах і легких і важких ланцюгів можуть бути присутніми вуглеводні компоненти. Кількість, хімічний склад і локалізація цих олігосахаридів варіює залежно від класу або підкласу імуноглобулінів.

Порядок розташування субодиниць в четвертичній структури наступний. Дві однакові H-ланцюги спрямовані в молекулі так, що їх COOH-кінці зближені, і ланцюги закручені відносно один одного ділянками, що включають домени CH2, CH3 і, якщо такий є, CH4. Між доменами двох ланцюгів утворюється не тільки безліч характерних для четвертичної структури слабких хімічних зв'язків, а й кілька ковалентних S-S-зв'язків, що і забезпечує жорстку фіксацію цих ділянок субодиниць відносно один одного. Кількість S-S-зв'язків і їх положення варіює залежно від класу і підкласу імуноглобулінів, але більшість з них розташовується в районі друге константних доменів.

У кожній з H-ланцюгів між доменами CH1 і CH2 є багатий залишками проліну так званий шарнірну ділянку, що забезпечує рухливість що складаються з доменів V і CH1 частин субодиниць щодо решти молекули. Саме до цих рухомих частин приєднані ідентичні один одному легкі ланцюги, NH2-кінці яких тісно зближені з NH2-кінцями важких ланцюгів. Легка ланцюг жорстко фіксована щодо важкої безліччю слабких хімічних взаємодій між варіабельними і константними доменами і, як правило, однією ковалентним зв'язком між доменами CH1 і CL. Таким чином рухливими щодо одне одного і щодо решти імуноглобуліну виявляються дві ділянки четвертичної структури, що включають легкі субодиниці і домени V і CH1 важких субодиниць. Така будова молекули забезпечує найкращі умови для виконання антитілами їх головної функції - зв'язування з антигеном.

Вирішальний внесок у розуміння того, як структура імуноглобуліну відповідає його функціям, внесли роботи співробітників лабораторій Р.Портера і Д.Едельмана. Проведені в 50-60 роках XX століття досліди по фрагментації молекул імуноглобулінів показали (рис. 4), що під впливом ферменту папаїну утворюються три фрагмента. Два з них виявилися ідентичними між собою і здатними зв'язувати антиген, третій відрізнявся від двох перших і з антигеном НЕ взаємодіяв. Виходячи з цього, перший подвоєний ділянку молекули отримав позначення Fab (від англ. Antigen binding - зв'язує антиген), а другий - Fc (від англ. Crystallisable - здатний до кристалізації, тому що він першим випадав в осад при осадженні продуктів протеолізу з розчину). Обробка імуноглобулінів пепсином приводила до формування одного великого фрагмента і безліч мілких. У цьому випадку тільки великий фрагмент пов'язував антиген, причому в два рази більшої кількості, ніж отримані при дії папаїну антигензв'язуючих фрагменти.

Крім того, при обробці цілих молекул і фрагментів меркаптоетанолом і іншими розривають S-S-зв'язку агентами з'ясувалося, що антигензв'язуючих фрагменти завжди містять легкі ланцюги і частина важких, а інша частина молекули сформована тільки ділянками важких ланцюгів. Було також встановлено, що ні легкі, ні важкі ланцюги окремо антиген пов'язувати не могли. З цього випливало, що антигензв'язуючих ділянку в частині Fab формується з обов'язковою участю двох ланцюгів. З'ясуванню того, які саме ділянки ланцюгів важливі для взаємодії з антигеном, допомогло порівняння амінокислотного складу імуноглобулінів, що розрізняються по специфічності зв'язування з антигеном. Виявилось, що відмінності мають місце в перших від NH2-кінця доменах і легких і важких ланцюгів, внаслідок чого вони і отримали (як уже зазначалося вище) назва варіабельних. Це і дозволило сформулювати уявлення про паратопе - ділянку молекули імуноглобуліну, який вступає в безпосереднє хімічну взаємодію з поверхнею антигенної детермінанти епітопом.




Рис. 4. Схема протеолітичного розщеплення молекули IgG 1 людини папаїном і пепсином (Песнякевич А.Г., 2007)

Паратоп виникає в результаті зближення варіабельних доменів легкого та важкого ланцюга при формуванні четвертинної структури імуноглобуліну. Фактично між щільно з'єднаними субодиноцями залишається невелика за розмірами ніша, форма якої дзеркально відповідає тій чи іншій антигенній детермінанті. У створенні внутрішньої поверхні цієї ніші беруть участь по три ділянки варіабельних доменів легкої і важкої ланцюгів. Саме в цих ділянках і спостерігається більшого всього відмінностей в амінокислотним складом антитіл, вироблених у відповідь на дію різних антигенів, внаслідок чого вони і отримали назву **гіперваріабельних**. У кожній з ланцюгів ці ділянки роз'єднані, між ними знаходяться фрагменти ланцюгів з постійним амінокислотним складом, які називаються **каркасними ділянками**. Однак при формуванні третинної структури кожної субодиноці і потім при об'єднанні їх в четвертинних структуру всі шість гіперваріабельних ділянок зближуються і стають стінками углиблення між субодиноцями.

Експериментально показано, що достатньо однієї амінокислотної заміни в межах будь-якої з гіперваріабельних областей, щоб змінити специфічність зв'язування антитіла з антигеном. З цього і робиться висновок, що фактично взаємодія антиген-антитіло зводиться до просторового поєднання виступу на молекулі антигену (антигенної детермінанти) та западини на молекулі антитіла (антигензв'язуючих ділянки). Тільки при збігу просторових конфігурацій ніші і виступи і можливе утворення слабких хімічних зв'язків між паратопом і Епітом, що забезпечують оборотне зв'язування антигену з імуноглобуліном.

Таким чином, з'ясувалося, що для взаємодії антитіла з антигеном потрібні лише дві невеликі ділянки імуноглобуліну. Природно, виникали питання про роль інших частин цієї складної молекули. Поступово і ці питання були вирішені (рис. 5).

2. Функції окремих ділянок (доменів) молекули імуноглобулінів.

Так, відомо, що специфічність вже сформованого антитіла до антигену не змінюється навіть після осадження антитіл з розчину іонами солей або органічними розчинниками. Виходячи з цього, можна вважати, що взаєморозташування легких і важких субодиноць імуноглобуліну є максимально стабільним, ймовірно, внаслідок структури не тільки варіабельних, але константних доменів. Фактично роль доменів CH1 і CL і полягає в підтримці антигензв'язуючих ділянки і його паратопа в незмінному стані. Крім того, для домену CH1 імуноглобулінів показана здатність зв'язуватися з білком C4b з системи комплементу.

Істотно, що два несучих паратопа фрагмента молекули можуть займати в просторі практично будь-яке положення щодо її Fc-частини. Це забезпечується шарнірними ділянками важких ланцюгів. Вважається, що рухливість Fab є однією з умов, важливих для просторового поєднання антигенних детермінант і антигензв'язуючих ділянок антитіл.

Наступний за шарнірною ділянкою другий константний домен у імуноглобулінів всіх класів грає **роль у визначенні часу існування антитіл** в плазмі крові і тканинній рідині. Показано, що катаболізм антитіл пов'язаний розщепленням цих молекул протеазами саме в районі домену CH2 і що на швидкість катаболізму впливає со-стояння розташованих тут вуглеводних компонентів. Передбачається, що і розташовані в інших доменах бічні олігосахаридних ланцюга можуть мати відношення до катаболізму, хоча функція вуглеводів в молекулах імуноглобулінів ще не з'ясована повністю.





Домен	Функция
	V_H + V_L Связывание антигена
	C_{γ1} Связывание C4b молекулы системы комплемента
	C_{γ2} Связывание C1q молекулы системы комплемента. Контроль скорости катаболизма иммуноглобулина
	C_{γ2} + C_{γ3} Связывание с: макрофагами, нейтрофилами, эозинофилами, тромбоцитами, клетками-киллерами. Взаимодействие с протеином А стафилококков

Рис. 5. Функції доменів імуноглобулінів IgG людини
(Песнякевич А.Г., 2007)

Найважливішою функцією CH2-домену є його здатність зв'язувати білок з системи комплементу і тим самим запускати

класичний шлях її активації. Встановлено, що ділянка зв'язування утворений бічними ланцюгами залишку глутаміну в положенні 318 і двох залишків лізину в положеннях 320 і 322. Розташування цього ділянки в даній частині молекули, як думають, не є випадковим.

Передбачається, що у вільно рухається в плазмі крові або тканинної рідини внаслідок постійного переміщення в просторі його Fab-частин сайт зв'язування є недоступним для взаємодій. Коли ж імуноглобулін зв'язується з антигенами на поверхні чужорідної клітини, рух Fab обмежується і має можливість розпочати активацію. Тим самим комплемент не може запускатися вільними, не пов'язаними з антигенами антитілами, постійно присутніми в значній кількості в крові.

Подібний механізм, ймовірно, реалізується і при запуску активації системи комплементу імуноглобулінами класу M.

Домен CH2 і CH3 антитіл класу визначають і ще одну найважливішу функцію - взаємодія з рецепторами на поверхні лейкоцитів і клітин стінок розташованих в плаценті кровоносних судин. Саме завдяки цьому здійснюється найбільш ефективну імунну фагоцитоз і формується пасивна форма природного набутого імунітету у новонароджених. У імуноглобулінів класу E за зв'язування з рецепторами тучних клітин і базофілів також відповідають ділянки важких ланцюгів, локалізовані в третьому і другому константних доменах.

Вивчення хімічної структури молекул антитіл дозволило устано-вить не тільки викладені вище загальні принципи їх будови, але і їх різноманітність. У ссавців виявлено 5 класів імуноглобулінів, частина з яких ще поділяється на підкласи. Приналежність до класу або підкласу визначається структурою важких ланцюгів, які прийнято позначати буквами грецького алфавіту, відповідними латинськими буквами в найменуванні класу. У разі ділення класу на підкласи букві, що означає підтип важкої **це-пі**, додана відповідна підкласу цифра. Наприклад, до складу імуноглобуліна підкласу IgG3 входять важкі ланцюги $\gamma 3$.

Належать до різних типів і підтипів важкі ланцюги відрізняються один від одного за:

- **за первинною структурою** (кільстю і розташуванням амінокислотних залишків і відповідно молекулярної маси);
- **за третинною структурою** (кількістю і просторовою конфігурацією доменів, кількістю всередині доменних S-S-зв'язків, кількістю і складом вуглеводних компонентів, протяжністю шарнірного ділянки);
- і х участі в утворенні четвертинної структури (кількості межцепьєвих S-S-зв'язків).

На відміну від важких, легкі ланцюги не настільки різноманітні, їх існує всього два типи, які прийнято позначати κ (каппа) і λ (лямбда). Вони входять до складу імуноглобуліну незалежно від класу, але ніколи в одній молекулі імуноглобуліну не можуть бути присутніми легкі ланцюга обох типів. Ланцюги типу κ в цілому переважають кількісно. Наприклад, у людини це переважання виражається співвідношенням 3: 2, однак у інших видів ссавців ці співвідношення можуть бути іншими. Незважаючи на відмінності в амінокислотних послідовностях ланцюгів κ і λ , будь-яких функціональних відмінностей між ними не виявлено. У той же час тип важкого ланцюга фактично визначає біологічні особливості антитіл різних класів і продклассов).

3. Класифікація та функції окремих класів імуноглобулінів.

Головна особливість антитіл - здатність зв'язувати строго певний антиген. Наприклад, при кору в організмі починає вироблятися «противокоревой» імуноглобулін, проти грипу - «протигрипозний» і т. Д. Виділяють наступні класи імуноглобулінів: **JgG**, **JgM**, **JgA**, **JgD**, **JgE**.

3.1. Імуноглобуліни класу G. JgG – антитіла цього класу з'являються через якийсь час після того, як відбувся контакт з антигеном. Імуноглобуліни класу IgG (рис. 6) складають в нормі 70-80% від загальної кількості антитіл і є *основними забезпечуючими гуморальний імунітет молекулами*. Під час розвитку первинних імунних відповідей вони вже до 10 діб майже повністю замінюють з'являються першими **IgM**, а вторинна імунна відповідь практично відразу починається з їх продукції.




Рис. 6. Структура молекул людського IgG різних підкласів (Песнякевич А.Г., 2007)

Надалі до них приєднуються інші білки плазми (так званий комплемент), і бактеріальна клітина лізує (її оболонка розривається). Крім того, **IgG** беруть участь у виникненні деяких алергічних реакцій. Вони є головним захисним фактором у дитини перших тижнів життя, так як мають здатність проходити через плацентарний бар'єр в сироватку крові плоду. При природному вигодовуванні антитіла з молока матері через слизову оболонку кишечника новонародженого проникають в його кров.

Їх найменша серед антитіл молекулярна маса (близько 150 kD) і найбільш виражена здатність долати бар'єри між кров'ю і тканинами робить їх практично всюдисущими.

IgG в основному виконують протидії бактеріальні функції і утворюють антитіла проти полісахаридів бактеріальних оболонок, а також протіворезусних антитіла.

В даний час встановлено, що у людини виявлено 4 підкласу, серед яких переважає **IgG1** - 65% від усіх імуноглобулінів цього класу, **IgG2** складає 23%, **IgG3** - 8%, **IgG4** - 4%. Основні структурні відмінності між молекулами підкласів незначні і полягають в довжині шарнірних ділянок і кількості S-S-зв'язків між важкими ланцюгами. Проте, виявлено функціональні особливості представників кожного підкласу. Зокрема, **IgG2** гірше інших **IgG** проходить через плаценту і підсилює фагоцитоз. Найкращими активаторами комплекменту є IgG3 і IgG1, тоді як представники підкласу IgG4 взагалі не здатні активувати комплекмент.

3.2. Імуноглобуліни класу А. Друге місце за чисельністю посідають імуноглобуліни класу А (рис. 7). Їх кількість в плазмі крові становить від 15 до 20% загальної кількості імуноглобулінів, але головну роль антитіл цього класу пов'язують з їх здатністю потрапляти в секрети слизових оболонок і екзокринних залоз і саме там, фактично поза організмом, забезпечувати захист від антигенів. Виходячи з цього прийнято розрізняти дві форми IgA - сироваткову, що виявляється в плазмі крові, і секреторную.

IgA - виробляються лімфоцитами слизових оболонок у відповідь на місцевий вплив чужорідного агента, таким чином, вони захищають слизові оболонки від мікроорганізмів і алергенів. IgA гальмують прилипання мікроорганізмів до поверхні клітин і тим самим перешкоджають проникненню мікробів у внутрішнє середовище організму. Саме це попереджає розвиток хронічного місцевого запалення.

Як і IgG, імуноглобуліни класу А діляться на підкласи, але в даному випадку у людини їх всього два. Порівняння характерних для підкласів важких ланцюгів показало, що їх амінокислотні послідовності гомологічні на 95%, але невеликі відмінності в шарнірному ділянці за кількістю амінокислот істотно позначаються на властивостях молекул - імуноглобуліни підкласу IgA2 набагато більш стійкі до дії протеолітичних ферментів, в тому числі і бактеріальних протеаз.




Рис. 7. Структура **IgA** і **IgD** людини (Песнякевич А.Г., 2007)

3.3. Імуноглобуліни класу IgM. Цей вид антитіл (близько 5%) з'являється найпершим при контакті з антигеном (мікробом), підвищення їх титру в крові свідчить про гострий запальний процес, IgM грають важливу захисну роль при проникненні бактерій в кров на ранніх стадіях інфекції. До цього класу належать антитіла проти полісахаридів мікроорганізмів і вірусів.

IgM ще більш складні за структурою в порівнянні з іншими класами. У плазмі же крові вони завжди присутні у вигляді пентамер (рис. 8).




Рис. 8. Структура **IgM** людини (Песнякевич А.Г., 2007)

Експериментально продемонстровано здатність пентамер переміщати свої десять кінцевих ланцюгів в просторі. Завдяки изгибанию ланцюгів пентамер може взаємодіяти більш ніж п'ятьма антигензв'язуючих ділянками з антигенними детермінантами, розташованими в одній площині, приймаючи при цьому так звану «Крабовидную» конфігурацію.

Маючи 10 антигензв'язуючих ділянок, **IgM** можуть міцніше, ніж мономерні антитіла, пов'язувати антигени з декількома повторюючімія антигенними детермінантами. Пов'язуючи одночасно кілька антигенів, такі антитіла сприяють швидшому їх унічтоже-нню фагоцитами. Крім того, імуноглобуліни М, як і **IgA**, можуть потрапляти в секрети слизових оболонок і сприяти знищенню антигенів поза організмом. Проте у вищих ссавців **IgM** утворюються лише в невеликій кількості (1-5% від числа всіх імуноглобулінів) і тільки на перших етапах первинних імунних відповідей. Отже, незважаючи на всі вищеописані позитивні риси, у антитіл цього класу є недолік.

За сучасними уявленнями таким недоліком є низька мобільність: маючи велику (близько 900 kD) молекулярну масу і складну просторову конфігурацію, пентамер гірше, ніж мономерні, долають бар'єри між кров'ю і тканинами і в цілому повільніше дифундують. Ймовірно, тому в ході еволюції відібрали такі форми тварин, у яких завдяки їх більшій пристосованості до умов проживання в цілому закріпилася здатність утворювати велику кількість, нехай і менш міцно пов'язують антиген, але більш мобільних і спеціалізованих антитіл. Можна вважати, що на відміну від інших хребетних, що мають в якості домінуючих антитіл **IgM**, ссавці отримали кращий захист, перейшовши на переважну продукцію IgG для зв'язування чужорідних антигенів у внутрішньому середовищі і IgA для боротьби з антигенами на поверхні слизових оболонок.

3.4. Імуноглобуліни класу IgE. Особливе місце серед імуноглобулінів ссавців займають імуноглобуліни класу E (рис. 9). Головною відмінною рисою цих антитіл є те, що вони взаємодіють з рецепторами, які розташовуються на гладких клітинах і базофілів. Закріплені на поверхні цих клітин, імуноглобуліни E, цілком ймовірно, забезпечують більш швидкий запуск запальних реакцій при вторинних попаданнях антигена. Однак ця їхня здатність стимулювати базофіли і огрядні клітини на викид медіаторів запалення може при певних ситуаціях служити причиною розвитку небажаного для людини імунного відповіді на деякі антигени - однієї з форм гіперчувствительності негайного типу. Саме тому в перші роки після отримання IgE їх називали реагінами (тобто забезпечують підвищений рівень реагування на антиген) або антитілами алергії.




Рис. 9. Структура IgE людини (Песнякевич А.Г., 2007)

В результаті взаємодії IgE з антигеном відбувається вивільнення гістаміну та інших медіаторів алергії, внаслідок чого розвивається алергічна реакція. При повторному контакті з алергеном взаємодія IgE відбувається на поверхні клітин крові, що призводить до розвитку анафілактичної алергічної реакції. Крім реакцій алергії, **IgE приймають участь в забезпеченні противоглистного імунітету.**

Антитіл цього класу утворюється найменше - близько 0,003% від загальної кількості продукуються імуноглобулінів. Причини перемикання невеликої частини плазматичних клітин на продукцію антитіл цього класу до сих пір залишаються нез'ясованими. Неясно також, чому при імунній відповіді на деякі антигени у конкретних людей їх кількість підвищується, що і визначає роль таких антигенів для цих людей як алергенів.

Ще однією характерною рисою **IgE є наявність у них чотирьох константних доменів в важких ланцюгах і відсутність в них шарнірного ділянки.**

3.5. Імуноглобуліни класу IgD. П'ятий клас антитіл ссавців становлять імуноглобуліни D (рис. 7). Їх продукується в організмі близько 1%, але в плазмі крові вони присутні в невеликій кількості. Більшість дослідників вважає, що в плазму антитіла цього класу потрапляють внаслідок руйнування В-лімфоцитів, на поверхні яких вони грають роль клітинних рецепторів. Ніяких інших функцій **IgD** не встановлено і, швидше за все, їх дійсно немає.

Крім класифікації імуноглобулінів за класами їх, як і антигени, прийнято розділяти в залежності від походження на:

- **аутоантитіла** - антитіла власного організму,
- **изоантитіла** - антитіла генетично ідентичних осіб,
- **гомо(ало-) антитіла** - антитіла іншої особи власного ж виду,
- **гетеро(ксено-) антитіла** - антитіла особи другого виду.

З причини, що викликала їх освіту, антитіла прийнято ділити **на імунні**, що є результатом вираженого відповіді на чужорідний антиген, і так звані **нормальні (природні)**. Нормальні антитіла утворюються в організмі без впливу антигену, з яким вони можуть специфічно взаємодіяти. Цілком ймовірно, їх освіту спадково детерміновано, але будь-яких даних про механізми такої детермінації поки немає.

Нормальні антитіла умовно ділять на дві групи. До першої відносяться гемаглютиніни α і β людини, що визначають несумісність крові людей різних груп. До другої - протибактерійні нормальні антитіла, антитіла проти деяких антигенів тваринного або рослинного походження. Відносно антитіл цієї групи не вдалося встановити визначають їх утворення гени і характер їх успадкування.

Особливо розглядаються так звані **неповні антитіла**. У невеликих кількостях їх виявляють практично у всіх людей, але причини і механізм їх виникнення досі не з'ясовані. Головна відмінність таких антитіл від звичайних полягає в тому, що вони реагують з антигеном тільки одним з двох антигензв'язуючих ділянок. Хоча причини їх появи досі не визначені, в медицині накоплений емпіричний досвід, який вказує на підвищення продукції неповних антитіл при деяких патологіях. Зокрема, їх кількість підвищено у матерів і новонароджених при резус-конфліктах, у людей, які страждають деякими видами алергій, при деяких інфекційних захворюваннях (дизентерії, черевному тифі, бруцельозі).

Найбільш важливими функціями імуноглобулінів в захисних реакціях організму є:

- 1) обмеження рухливості антигенів (дифузійної або активної) у внутрішньому середовищі і на поверхні слизових оболонок,
- 2) нейтралізація їх токсичних або патогенних властивостей,
- 3) опсонизація чужорідних частинок і посилення за рахунок цього ефективності фагоцитозу,
- 4) активація системи комплементу,
- 5) забезпечення антителозависимої клітинно-опосередкованої цитотоксичності (АЗКЦ).

ЛЕКЦІЯ 5-6

НЕСПЕЦИФІЧНИЙ (ВРОДЖЕНИЙ) І СПЕЦИФІЧНИЙ (НАБУТИЙ) ІМУНІТЕТ

1. Неспецифічний (вроджений) імунітет, його компоненти та їх функції
2. Поняття про специфічний (гуморальний, лимфоїдний) імунітет
3. Механізми неспецифічного (вродженого) імунітету:
 - 1.1. Фагоцитоз та його фази;
 - 3.2. Позаклітинне знищення (цитотоксичність) - макрофаги і нормальні кілери (НК);
 - 3.3. Система комплементу та її активація:
 - а) альтернативний шлях активації комплементу;
 - б) класичний шлях активації комплементу;
 - в) білки гострої фази;
 - г) інтерферони;
 - д) лізоцим;
 - е) фібронектин;
 - ж) катионні білки.

1. НЕСПЕЦИФІЧНИЙ ІМУНІТЕТ.

Неспецифічний імунітет властивий тваринам всіх рівнів розвитку і, в свою чергу, поділяється на *спадковий і клітинний* (фагоцитарний). В основі спадкового імунітету лежать загальнобіологічні явища спадковості, мінливості і природнього відбору. Якщо в популяції макроорганізмів, яка страждає від певної інфекції, в результаті випадкової мутації з'являється індивід, білкові молекули якого асимілюються патогенним мікроорганізмом-агресором та є токсичними для нього, то цей індивід або група індивідів виживає і дає життєздатне потомство, а решта популяції гине. Правда, мікроорганізми також модифікуються і пристосовуються до нових умов, з часом захоплюючи і цей ареал, тобто процес боротьби за виживання між макро- і патогенними мікроорганізмами відбувається постійно. Тому є підстави вважати, що мікроорганізми і їх молекулярні патогенні чинники є важливими і не єдиними біотичними агентами, які продовжують природний відбір серед людей. До факторів спадкового імунітету, що розвинулися в процесі еволюції, належать протимікробні і противірусні чинники.

Лізоцим (мурамідаза) - білок, який проявляє високу протеолітичну активність, руйнує пептидоглікани бактеріальних мембран. Він міститься в білку курячого яйця, в слині, слюзах, в складі кишкового соку, скелетних м'язів, мозку, а також у гранулах нейтрофілів. Крім бактеріолітичної дії лізоцим стимулює також синтез антитіл.

Комплемент - термочутливий (інактивується нагріванням) комплекс, що складається з більш ніж 20 білків, здатних до самоорганізації в систему. Більшість білків цієї системи знаходяться в плазмі крові в неактивному стані у вигляді проферментів, які активуються в певній послідовності в разі контакту з бактеріями і вірусами. Активація комплементу викликає бактеріолізис, стимулює

фагоцитоз, продукцію і виділення тканинами речовин, які беруть участь в запальних процесах. В активації комплементу бере участь білок сироватки крові **пропердин**, який має виражену протибактеріцидну і противірусну активність.

Інтерферон - це низькомолекулярний білок, що продукується лейкоцитами, діє на клітини, інфіковані вірусом, не прямо, а стимулюючи вироблення противірусних речовин сусідніми неінфікованими клітинами макроорганізму.

Катіонні білки - дефензіни і гістони - проявляють високу протибактеріальну і противірусну активність; ферменти активного кисню **НАД**-залежні флавінові оксидази генерують активні форми кисню (сінклетний O_2 , супероксидний O_2 , H_2O_2), які окислюють чужорідні внутрішньоклітинні включення; білок лактоферин знищує бактерії, конкуруючи з ними за залізо середовища.

Більшість зазначених факторів синтезується нейтрофілами і еозинофілами, моноцитами і діють в самій клітині, в її фагосомах або виділяються в кров і виконують свої функції поблизу лейкоцитів. Всі вони є елементами системи неспецифічного спадкового гуморального імунітету.

До неспецифічного імунітету належить також *клітинний імунітет*, обумовлений активністю лейкоцитів і тромбоцитів. Найбільшу фагоцитарну активність проявляють нейтрофіли і моноцити. Зокрема, частина моноцитів, потрапляючи в тканини, перетворюється там в макрофаги, наприклад альвеолярні, зірчасті макрофагоцити (клітини Купфера печінки) і інші. Для цих клітин не має значення вид мікроорганізму або природа токсину. Якщо вони здатні знищити це чужорідне тіло, то захоплюють його і перетравлюють. Нещодавно було відкрито специфічний різновид лімфоцитів - НК-лімфоцити (справжні кілери - natural killers), які здатні за допомогою білка *перфорина* без попередньої сенсibiliзації знищувати пухлинні і інфіковані вірусами клітини макроорганізму. Ці НК-лімфоцити є «першою лінією оборони» макроорганізму, оскільки вони відразу ж реагують на появу чужорідних клітин.

2. Поняття про специфічний (гуморальний, лимфоїдний) імунітет,


Притаманний тільки хребетним тваринам, здійснюється лімфоцитами.

Лімфоцити, що виходять в кров з кісткового мозку, імунологічно є нейтральними, або нульовими. Імунокомпетентними вони стають після дозрівання або диференціації в органах лімфоїдної системи (мал.10).

Частина нульових лімфоцитів з кров'ю потрапляє до вилочкової залози – тимусу- і, внаслідок складної диференціації, перетворюються в імунокомпетентні Т-лімфоцити, є такі, що здатні вступати в реакцію з антигеном (бактеріями, чужорідним білком і т.і.). Вперше зустрівши певний антиген, Т-лімфоцит «запам'ятовує» його і починає ділитися. **Велика частина знову Т-лімфоцитів** вступає в реакцію з антигеном і за допомогою перфорина знищує його. Це Т-лімфоцити-кілери (вбивці). Частина Т-лімфоцитів в реакцію не вступає і продовжує циркулювати з кров'ю, іноді все життя. Це лімфоцити імунологічної пам'яті.

У разі повторного контакту їх з таким же антигеном вони «впізнають» його, починають інтенсивно ділитися (пролиферувати), утворюючи велику кількість Т-лімфоцитів-вбивць, та знищують антиген.

Рис. 10. Схема дозрівання і диференціації лімфоцитів при специфічному імунітеті:
 1- костний мозок; 2, 4, 5, 6 — кров; 3 - центральні лімфоїдні органи



Частина клітин імунологічної пам'яті продовжує циркулювати в організмі до наступного контакту з антигеном. Зрозуміло, що різні Т-лімфоцити «запам'ятовуються» й налаштовуються на реакцію з різними антигенами, але кожен лімфоцит розпізнає тільки один антиген. У цьому і полягає специфічність такого імунітету, хоча сам діючий фактор **Т-кілерів - церфорін** - є неспецифічним. Серед Т-лімфоцитів розрізняють також **Т-хелпери** (помічники), без яких лімфоцити-кілери не в змозі виконувати свою функцію, **лімфоцити-супресори**, які пригнічують імунні реакції та інші.

Друга частина нульових лімфоцитів проходить диференціацію в лімфатичних вузлах кишечника, апендиксі та кістковому мозку. Вони отримали назву В-лімфоцитів, оскільки вперше цей процес був досліджений у птахів, в яких він відбувається в спеціальному органі – фабрицієвій сумці (bursa). Молоді лімфоцити током крові розносяться в лімфоїдні утворення різних органів, де і відбувається їх диференціація, в результаті якої вони стають імунокомпетентними. Проте вони ще не є зрілими ефекторними (діючими) В-лімфоцитами. На їх поверхні містяться вже готові молекули імуноглобуліну - антитіла до конкретного антигену. При першому контакті

В-лімфоцитів з антигеном здійснюється «запам'ятовування» антигену і проліферація В-лімфоцитів. Велика частина дочірніх клітин осідає в центрах розмноження в лімфоїдній системі організму і перетворюється в плазматичні клітини, які синтезують антитіла, - виникає первинна гуморально імунна відповідь.

Решта В-лімфоцитів знову виходе в кров і стає лімфоцитами імунологічної пам'яті. У разі появи антигену В-лімфоцити починають синтезувати антитіла до того антигену, що спровокував цю імунну реакцію, **Які, пройшовші через їх мембрану, переходять в тканини рідину и кров.** І вже за межами В-лімфоцитів, в плазмі або в тканинах відбувається реакція антиген-антитіло, в результаті якої антиген знищується. Це вторинна гуморально імунна відповідь, яка відбувається значно **активніше и швидше, чем первинна, а також швидше (десятки хвилин, годинник)**, ніж вторинна клітинна імунна відповідь, викликана Т-лімфоцитами (1-2 діб). Відповідно, першу з них називають імунною реакцією негайного, а другу - уповільненого типу.

Виходячи з описаних вище особливостей реагування імунної системи на антиген, в медичній практиці застосовують метод специфічної профілактики інфекційних хвороб - вакцинацію. Вона полягає в тому, що попередньо здійснюється штучний контакт макроорганізму з ослабленим інфекційним агентом, який не викликає захворювання, але призводить до появи лімфоцитів імунологічної пам'яті до цього антигену. У разі повторного, вже не спровокованого контакту макроорганізму з цим антигеном, лімфоцити проліферують та здійснюють ефективну імунну реакцію, запобігаючи захворювання.

Т- і В-лімфоцити розрізняються не тільки за походженням і властивостями, але й за механізмом дії. Так, рецептори Т-лімфоцитів відрізняють «свое» від «чужого» або зміненого «свого» завдяки наявності на поверхні клітин антигенів гістосумісності і специфічно реагують на певний антиген, але здійснюють імунну реакцію за допомогою неспецифічного фактору перфорина чи інших протеаз. Що стосується В-лімфоцитів, то розміщені на їх мембрані рецептори і є антитілами, які продукуються В-лімфоцитами при імунній реакції та безпосередньо вступають в специфічну реакцію з відповідним антигеном за межами лімфоцита.

Обидві групи лімфоцитів також достатньо тісно взаємодіють между собою. Зокрема, Т-лімфоцити-хелпери можуть активізувати синтез антитіл В-лімфоцитами, а Т-супресори, навпаки, пригнічують гуморальні реакції антиген-антитіло, що обумовлені В-лімфоцитами. Існує також чітка взаємодія меж системами, що забезпечують специфічний та неспецифічний імунітет. Так, неспецифічний фактор - комплемент - при наявності специфічних антитіл викликає лізіс бактерій. Макрофаги передають антигенну інформацію про знищених ними мікроорганізми Т-лімфоцитам-кілерам.

3. МЕХАНІЗМИ НЕСПЕЦИФІЧНОГО (ВРОДЖЕНОГО) ІМУНІТЕТУ

Неспецифічні (вроджені) захисні механізми являють собою сукупність всіх фізіологічних чинників, здатних

- ▶ запобігти попаданню в організм або
- ▶ нейтралізувати і руйнувати прониклі в нього чужорідні речовини і частинки або власні змінені клітини, що утворилися в ньому. Ці механізми не володіють специфічністю щодо агента, який впливає.

Крім згаданих механічних і хімічних чинників існує кілька інших способів захисту: **фагоцитоз** («поїдання» клітинами), позаклітинне знищення заражених вірусами і пухлинних клітин за допомогою цитотоксичних факторів (**клітинна цитотоксичність**) і руйнування чужерідних клітин за допомогою розчинних бактерицидних з'єднань.

3.1. Фагоцитоз

Фагоцитоз являє собою філогенетично найбільш давню імунну реакцію. Він є першою реакцією імунної системи на впровадження чужорідних антигенів, які можуть надходити в організм у складі бактеріальних клітин чи вірусних часток, а також у вигляді високомолекулярного білка або полісахариду. Макрофаги і моноцити - це стародавні клітини імунної системи. Останні є тими, що циркулюють в периферичній крові попередниками макрофагів, функції яких різноманітні і не вичерпуються потребами імунного захисту організму.

Вперше на захисну функцію макрофагів вказав І. І. Мечников, який відкрив явище фагоцитозу і отримав за це Нобелівську премію в 1908 р. В теперешній час відома інша фундаментальна роль макрофагів - представлення цими клітинами антигенів лімфоцитам. Без цієї функції макрофагів неможливо специфічне розпізнавання чужорідного антигену. Крім того, макрофаги є продуцентами численних медіаторів імунних реакцій (інтерлейкіни, простагландини), а також білків системи комплементу.

Основою еволюційного становлення фагоцитозу як імунологічного феномена з'явилася травна функція. Предкові одноклітинні організми поглинали і переварювали чужорідні речовини зовнішнього середовища з метою харчування. Такий тип харчування зберігся у сучасних протозоа, губок і кишковопорожнинних. Джерелом живлення, можливо, служили не тільки неструктуровані речовини, але і прокаріоти, серед яких зустрічається багато патогенних мікроорганізмів. Незважаючи на вдосконалення в філогенезі механізмів специфічного імунного захисту, фагоцитарна функція амебоцитів-макрофагів зберіглася в еволюції від одноклітинних до вищих багатоклітинних, включаючи ссавців.

Моноцити (макрофаги). Основою всієї моноцитарно-фагоцитарної системи (МФС) являється популяція імунокомпетентних клітин - моноцитів. У периферичній крові людини в нормальних умовах міститься зазвичай $0,2-0,8 \times 10^9$ цих клітин на 1 л. Після недовгого перебування в крові моноцити мігрують в тканини, де формують МФС. Моноцити присутні всюди - в сполучній тканині, навколо мембран дрібних кровоносних судин, високий вміст їх виявляється в легенях (альвеолярні макрофаги) і печінки (клітини Купфера). Макрофаги вистилають слизову селезінки та лімфатичних вузлів.

У разі появи клітин, що несуть чужорідну інформацію, виникає хемотаксичний сигнал, що направляє і прискорює рух моноцитів з кровотоку і оточуючих тканин. Макрофаги і деякі інші клітини МФС живуть близько 2 місяців, а деякі субпопуляції - багато років. Вважають, що саме цими довгоживучими клітинами визначається довічна фіксація татування і «чорні легені» курців.

Механізм фагоцитозу однотипний і включає 8 послідовних фаз (мал. 11):

- 1) хемотаксис (спрямований рух фагоцитів до об'єкту),
- 2) адгезія (прикріплення до об'єкту),
- 3) активація мембрани (актин-міозінова система фагоциту),
- 4) **початок власне фагоцитозу, який пов'язан з утворенням навколо частки псевдоподій, що поглинається**
- 5) утворення фагосоми (частка, що поглинається, виявляється ув'язненою в вакуоль завдяки насунанню на неї плазматичної мембрани фагоциту подібно застібці-блискавки,
- 6) злиття фагосоми з лізосомами,
- 7) знищення і переварювання,
- 8) викид продуктів деградації з клітки.

Хемотаксис. Чужорідні клітини посилають в оточуюче середовище хемотаксичні сигнали (найчастіше це продукти метаболізму мікроорганізмів), в напрямку яких фагоцит починає рухатися. На цей сигнал приходять перші елементи, що фагоцитують, які, активуючи інші імунокомпетентні клітини, стимулюють їх до вироблення медіаторів, підсилюють хемотаксис. Далі хемотаксичний потенціал посилюється за рахунок новостворених антитіл, а також ряду факторів, що утворюються при руйнуванні макрофагами судин і тканин в запальному вогнищі. Цей хемотаксичний сигнал другого порядку (розвиненого вогнища запалення) забезпечує підтримку в ньому активної роботи за рахунок надходження нових порцій імунокомпетентних клітин. Досягнувши вогнища запалення, макрофаг зупиняється під впливом фактора гальмування міграції лейкоцитів, що виробляється Т-лімфоцитами-хелперами. Зникнення в вогнищі запалення чужорідних антигенів, початок процесів регенерації веде до значного зменшення хемотаксичного стимулу і появи продуктів, що представляють собою негативний хемотаксичний сигнал. В результаті цього нові фагоцити перестають мігрувати в запальне вогнище, а ті, що залишилися життєздатними розсіюються по всій тканини.




Рис. 11. Основні фази фагоцитоза і знищення бактерій

Адгезія. Акт адгезії включає дві фази: розпізнавання чужорідного об'єкта і прикріплення, або власне адгезію. Адгезія фагоцитів до об'єкта фагоцитозу відбувається вкрай повільно в тому випадку, якщо відсутнє попереднє специфічне розпізнавання чужорідних клітин.

Захоплення (власне фагоцитоз). У процесі фагоцитозу плазматична мембрана макрофага за допомогою освічених нею виступаючих складок захоплює об'єкт фагоцитозу і огортає його. Утворюється при цьому невелика вакуоль називається фагосомаю. Надалі фагосома відривається від поверхні мембрани і переміщається в цитоплазму.

Кіллінг (вбивство). У фагосомі захоплена чужорідна клітина гине. Для здійснення киллінга макрофаг продукує і секретує в фагосому реакціоспособні похідні кисню.

Перетравлення. Останній етап фагоцитозу - перетравлення захваченого і убитого матеріалу. Для цього з фагосомаю, що містить об'єкт фагоцитозу, об'єднуються лізосоми, які містять більше 25 різних ферментів, в число яких входить велика кількість гідролітичних ензимів. У фагосомі відбувається активація всіх цих ферментів, так званий метаболічний вибух, в результаті якого фагоцитований об'єкт перетравлюється.

Нейтрофіли. Головний бар'єр проти мікробних інфекцій представляють нейтрофіли - популяція лейкоцитів, інакше, звана мікрофагами, або мікрофагоцитами. У крові людини нейтрофіли домінують серед інших лейкоцитів. Приблизно 70% нейтрофілів не циркулюють в крові, а прикріплені до стінок судин. Головний резервуар пристінкових нейтрофілів - мікросудини легких: число депонованих тут клітин в декілька разів перевершує кількість що циркулюють нейтрофілів. Термін перебування нейтрофілів в кровотоці становить близько 6,5 год.

Основною функцією нейтрофілів є знищення чужорідних клітин або речовин шляхом фагоцитозу. Цю функцію нейтрофіли здійснюють тільки після виходу їх з судинного пулу. Процес фагоцитозу, здійснюваного нейтрофілами, складається з тих же самих етапів, які вище описані для макрофагів. На відміну від макрофагів, нейтрофіли можуть фагоцитировать чужорідну клітку або частку тільки один раз, після чого вони гинуть.

Еозинофіли. Поліморфноядерні «двоюрідні брати» нейтрофілів - еозинофіли - містять на відміну від останніх гранули, інтенсивно окрашені кислими барвниками. Еозинофіли володіють цитотоксичною дією на багато паразитичні форми, в тому числі на великих паразитичних черв'яків типу гельмінтів, які не можуть бути фагоцитированими.

Еозинофіли людини містять приблизно 200 гранул на клітку. На поверхні еозинофілів є рецептори до деяких антитіл, особливо імуноглобулінів IgG та IgE класів. Активація цих рецепторів призводить до потужного посилення дихання, що супроводжується виробленням значної кількості токсичних метаболітів кисню. Еозинофіли **продукують** досить багато перекису водню. Прикріплюючись до паразита, еозинофіли **локально** звільняють вміст гранул і навіть вводять його безпосередньо в цитоплазму клітин. У разі гельмінтозів токсичний ефект спостерігається через 6-18 год після фіксації еозинофілів на паразитичному черв'яка. Крім активних метаболітів кисню важливу роль в здійсненні цитотоксичної дії еозинофілів, ймовірно, грають катіонні білки, які «протикають» мембрану клітини-мішені подібно перфорином НК.

3.2. Позаклітинне знищення (цитотоксичність)

Макрофаги. Відомо, що фагоцитуючі клітини здатні знищувати мікроорганізми і залишки тканин не тільки всередині, але і поза клітиною. Фагоцити при цьому не поглинають об'єкт, а взаємодіють з ним за допомогою рецепторів і вбивають його. В елімінації пухлинних клітин і клітин, заражених вірусами, беруть участь не тільки макрофаги, як це було прийнято думати, а й нейтрофіли.

Під час антигенної стимуляції фагоцитів різко зростає поглинання кисню і в середовищі з'являються його високореактивні метаболіти. Останні здатні пошкоджувати чужорідні клітини самі по собі і в комбінації з неkotримі іншими мікробіцидність факторами, наприклад, з мієлопероксидазою. Перекис водню разом з мієлопероксидазою і системою галогенірованя є вельми активним цитотоксичним агентом щодо пухлинних клітин і клітин, заражених вірусами. Для здійснення цитотоксичних ефектів фагоцитуючі клітини повинні бути активовані цитокінами або іншими гуморальними факторами неспецифічного захисту організму.

Нормальні кілери. У знищенні заражених вірусами і пухлинних клітин беруть участь особливі елементи імунної системи - нормальні кілери (НК). НК - це великі зернисті лімфоцити. Вперше ці клітини були виявлені в аденокарцинома молочної залози у мишей. Було показано, що НК мають цитолітичної активністю, спрямованої проти широкого спектра пухлинних клітин-мішеней. НК повністю позбавлені класичної імунологічної специфічності і можуть знищувати будь-які пухлинні клітини незалежно від їх органного, генетичного і видового походження. НК, на відміну від В-лімфоцитів, не мають вбудованих в мембрану іммуноглобулінових молекул; вони не містять клітинних рецепторів і антигенних детермінант, властивих Т-лімфоцитам.

Механізм знищення клітин НК-кілерами. НК дізнаються певні структури високомолекулярних глікопротеїнів, які знаходяться на мембрані пухлинних або заражених вірусами клітин. Завдяки цьому НК відрізняють такі клітини від нормальних. Впізнавання клітини-мішені і зближення з нею відбувається за рахунок рецепторів НК. Для лізису клітин-мішеней за допомогою НК необхідні тісні міжклітинні контакти.

В результаті тісної міжклітинної взаємодії між клітиною-мішенню і НК останній активується і викидає вміст своїх гранул в вузьку межклеточную щілину, що виникає при контакті клітин. Можливо, що головна роль в подальшому знищення клітини-мішені належить перфоріном, або цитолізіну, який може вбудовуватися в мембрану клітини-мішені з утворенням трансмембранної пори. Гранули НК містять серинові протеїнази, миєлопероксидазу, перекис водню, а також лімфотоксин, який шляхом екзоцитозу проникає в клітину-мішень і викликає пошкодження ядра. Пошкодження клітини супроводжуються порушенням її водно-сольового гомеостазу і призводять до її лізису. НК здатні неодноразово здійснювати своє цитотоксичну дію.


3.3. Система комплементу і її активація.

Комплементом називають складний комплекс білків і глікопротеїнів (близько 20), які беруть участь у захисті організму від чужерідних клітин. Для цієї системи характерний швидкий, багаторазово усилення відповідь на первинний антигенний сигнал за рахунок каскадного процесу. При цьому продукт однієї реакції служить каталізатором подальшої. Перші дані про існування системи комплементу були отримані в кінці XIX в. при вивченні механізмів захисту організму від проникаючих в нього бактерій і знищення чужерідних клітин, введених в кров. Ці дослідження показали, що на проникнення мікроорганізмів і чужерідних клітин організм відповідає утворенням антитіл, здатних агглютинувати ці клітини, не викликаючи при цьому їх загибелі. Додавання до цієї суміші свіжої сироватки викликало загибель (цитоліз) чужерідних клітин. Зроблене спостереження послужило поштовхом для інтенсивних досліджень, спрямованих на з'ясування механізмів їх лізису.

Незважаючи на те, що комплемент досліджується вже більше 100 років, повне значення цієї конститувної захисної системи, ймовірно, ще не встановлено. У міру вивчення інших імунологічних реакцій з'ясувалося причетність комплементу до цілого ряду подій, що дозволяє говорити про його більш широкому біологічному дії, ніж просто знищення мають клітинну будову патогенів (мал. 12).

Ряд компонентів системи комплементу позначають символом «С» і цифрою, яка відповідає хронології їх відкриття. У найбільшій концентрації в сироватці крові людини присутній компонент С3 (1,2 мг / мл). Існує два шляхи активації комплементу: без участі антитіл - альтернативний і за участю антитіл - класичний.

Альтернативний шлях активації комплементу. Перший шлях активації комплементу, що викликається чужорідними клітинами, з філогенетичної точки зору є більш древнім. Основні його етапи представлені на мал. 13. Ключову роль в активації комплементу грає С3, який представляє собою глікопротеїн, що складається з двох поліпептидних ланцюгів. При нормальних умовах внутрішня тіоетерична зв'язок в С3 повільно активується в результаті взаємодії з водою і слідові кількостями протеолітичних ферментів плазми крові, приводячи до утворення С3b і С3a (фрагменти С3). У присутності іонів Mg^{2+} + С3b може утворювати комплекс з іншим компонентом системи комплементу фактором В; потім останній фактор розщеплюється одним з ферментів плазми крові - фактором D. Утворився комплекс С3bBb (лінія над позначенням вказує на наявність ферментативної активності, при розщепленні компонентів системи комплементу більшого фрагменту присвоюється символ «b», а меншому - символ « a ») являє собою С3-конвертазу - фермент, який розщеплює С3 на С3a і С3b.



Мал. 12. Біологічні активності системи комплементу (А.Г.Песнякевич, 2007)

Деякі мікроорганізми можуть активувати С3 bb-конвертазу з утворенням великої кількості продуктів розщеплення С3. Потім інший білок пропердин взаємодіє з конвертазою, підвищуючи стабільність її зв'язування. Як тільки С3 розщеплюється за допомогою конвертази, його внутрішня тіоефірняя зв'язок активується, і реакційно похідне С3b ковалентно зв'язується з мембраною

мікроорганізму. Один активний центр C3bBb дозволяє зв'язатися з мікроорганізмом великій кількості молекул C3b. Існує і механізм, стримуючий цей процес в нормальних умовах: у присутності факторів I і H C3b перетворюється в C3bi, останній під впливом протеолітичних ферментів розщеплюється до кінцевих неактивних пептидів C3c і C3d.

Наступний активується компонент - C5, взаємодіючи з мембранозв'язані C3b, стає субстратом для C3bBb і розщеплюється з виникненням короткого пептиду C5a, причому фрагмент C5b залишається фіксованим на мембрані. Потім C5b послідовно приєднує C6, C7 і C8 з утворенням комплексу, що сприяє орієнтації на мембрані молекул останнього компоненту C9. Це призводить до розгортання молекул C9, проникненню їх всередину билипидного шару (мал. 14) і полімеризації в кільцеподібний «мембраноатакуючий комплекс» (МАК).




(неактивні пептиди)

Мал. 13. Альтернативний шлях активації комплементу, викликаний мікроорганізмами і його регуляція факторами I і H

Вклинюється в мембрану комплекс C5b-C7 дозволяє C8 увійти в безпосередній контакт з мембраною, викликати дезорганізацію її регулярних структур і, нарешті, привести до утворення спіралеподібних трансмембранних каналів. Формується трансмембранний

канал повністю проникний для електролітів і води. За рахунок високого колоїдно-осмотичного тиску всередині клітини в неї надходять іони Na^+ і води, що і призводить до лізису чужорідної клітини або мікроорганізму.



Мал. 14. Освіта мембраноатакуючого комплексу при активації комплементу по альтернативному шляху


Помимо способности лизировать клетки с чужеродной информацией комплемент обладает также другими важными функциями:

- а) за рахунок присутності на поверхні фагоцитуючих клітин рецепторів до C3b і C3bi полегшується адгезія мікроорганізмів;
- б) утворюються в процесі активації комплементу невеликі пептиди 3a і C5a («анафілатоксин») стимулюють хемотаксис нейтрофілів до місця скупчення об'єктів фагоцитозу, активують киснево механізми фагоцитозу і цитотоксичності, викликають викид медіаторів запалення із стовбурових клітин і базофілів, розширення кровоносних капілярів і підвищення їх проникності;
- в) протеїнази, що з'являються при активації комплементу, незважаючи на їх субстратне специфічність, здатні активувати інші ферментні системи крові: систему згортання і систему кінінообразовання;
- г) компоненти комплементу, взаємодіючи з нерозчинними комплексами антиген-антитіло, зменшують ступінь їх агрегації.


Класичний шлях активації комплементу. Ініціація класичного шляху відбувається в той момент, коли антитіло, поєднане з мікробом або інший кліткою, несучої чужорідну інформацію, пов'язує і активує перший компонент каскаду C1q . Ця молекула полівалентна щодо зв'язку антитіл. Вона складається з центрального коллагеноподібного стрижня, розвітлюється на шість пептидних ланцюжків, кожна з яких закінчується зв'язує антитіло субодиницею. За даними електронної мікроскопії вся молекула нагадує тюльпан (рис. 15).

Його шість пелюсток утворені С-кінцевими глобулярними ділянками поліпептидних ланцюгів. Глобулярні ділянки відповідають за взаємодію з антитілами, а колагеноподібний ділянку - за зв'язування з двома іншими субодиницями С1. Комплекс активується, набуває протеолітичні властивості і бере участь у формуванні центрів зв'язування інших компонентів каскаду. Завершується процес освіти мембраноатакуючого комплексу (МАК).


Субъединица C1q




Интактный C1q



Субъединица (C1r)₂(C1s)₂



Активированный C1q



Мал. 15. Структура першого компонента каскаду C1q системи комплементу (А.Г.Песнякевич, 2007)

Цей шлях активації комплементу важливий при знищенні фагоцитами старіючих або пошкоджених клітин організму. Класичний шлях активації комплементу в організмі людини та інших ссавців є превалюючим.

Білки гострої фази. Концентрація деяких білків плазми крові, загальна назва «білки гострої фази» різко збільшується у відповідь на інфекцію або пошкодження тканин. До цих білків відносяться С-реактивний білок (СРВ), сироватковий амیلордний А-білок, α 1-антитрипсин, α 2-макроглобулін, фібриноген, церулоплазмін, компонент комплементу С9 і фактор В.

В процесі інфекції продукти життєдіяльності мікробів (наприклад, ендотоксини) стимулюють вироблення інтерлейкіну-1 (ІЛ-1). ІЛ-1 не тільки підвищує температуру тіла, а й, впливаючи на печінку, різко посилює продукцію гепатоцитами С-реактивного білка. Концентрація останнього в плазмі крові може збільшуватися в 1000 разів.

Важлива властивість СРВ - можливість зв'язуватися в присутності іонів Са²⁺ з деякими мікроорганізмами. Утворився комплекс який активує систему комплементу класичним шляхом. Це призводить до зв'язування С3b з поверхнею мікроба, в результаті останній готується до фагоцитозу. Крім того, СРВ підсилює рухливість лейкоцитів, підвищує функціональну активність лімфоцитів і полегшує взаємодії антитіл з антигенами.

Інтерферони. У ссавців, так само як у інших хребетних тварин, виявлений ряд антивірусних агентів широкого спектру дії - інтерферони (ІФН). ІФН за своєю хімічною природою є білками і глікопротеїнами і ІФН виявився в числі перших клітинних білків, синтезованих поза організмом за допомогою генної інженерії.

Існує більше 20 різновидів інтерферону, які продукуються переважно макрофагами і В-лімфоцитами.

При вірусної інфекції клітини синтезують інтерферон і звільняють його в міжклітинний простір, де він зв'язується зі специфічними рецепторами сусідніх незаражених клітин. Вважають, що в клітці, що зазнала впливу інтерферону, починається синтез двох ферментів: протеїнази А та ферменту, що активує латентну ендонуклеази, що призводить до деградації мРНК вірусу і господаря. Кінцевий результат дії інтерферону полягає в освіті бар'єру з неінфікованих клітин навколо вогнища вірусної інфекції, щоб обмежити її поширення.

Найбільш низькі рівні інтерферонів спостерігаються у дітей до 3-х років і в осіб старше 60 років.

Лейкоцити донорів з I (0), III (B) і IV (AB) групами крові, як правило, добре продукують інтерферон. У донорів з групою крові II (A) майже в 40% випадків виявлено дефектність системи інтерферону, що виражається в різко зниженій здатності продукувати цей білок у відповідь на вірусну інфекцію. Можливо, саме з цим пов'язано те, що особи з групою крові II (A) більш схильні до гострих респіраторних інфекцій та серед них частіше зустрічаються хворі з різними онкологічними захворюваннями.

Вивчення впливу стресу на тварин виявило пряму кореляцію між здатністю лімфоцитів синтезувати інтерферон і рівнем стресу. Показано, що протягом першої доби після стресу різко знижується здатність синтезувати інтерферони. Лише на 8-й день після стресу відзначається нормалізація продукції інтерферону.

У спортсменів при граничних тренувальних навантаженнях, що мають характер стресових впливів, відбувається виражене пригнічення системи інтерферону. При подальшому відпочинку виявлена тенденція до нормалізації рівня інтерферону.

При вивченні факторів, що обумовлюють зниження загальної резистентності організму (охолодження, голодування, іонізуючі випромінювання, дія імунодепресантів, стероїдних гормонів і ін.), Було встановлено, що всі вони помітно пригнічують вироблення інтерферону.

Лізоцим (мурамідаза, мурамілпептидаза) - білок, який проявляє високу протеолітичну активність, руйнує пептидоглікани бактеріальних мембран. Він міститься в білку курячого яйця, в слині, слюзах, в сироватці крові, в складі шлункового і кишкового соку, скелетних м'язів, мозку, а також у гранулах нейтрофілів. Крім бактеріолітичної дії лізоцим стимулює також синтез антитіл.

Продуцується макрофагами. Лізоцим має прямий бактерицидну активність відносно грампозитивних бактерій (стафілококів, стрептококів) і в меншій мірі стосовно грамнегативних бактерій. Лізоцим руйнує клітинну стінку бактерій, що призводить до лізису мікроорганізмів. У разі інфекції грамнегативними мікроорганізмами лізоцим діє спільно з системою комплементу.

Фібронектин. Фібронектин - білок, який міститься в плазмі крові і тканинних рідинах. Продукується макрофагами, огрядними клітинами і фібробластами.

Фібронектин бере участь в клітинній адгезії, а також впливає на різні типи фагоцитарних реакцій. Фібронектин володіє хемотаксическою активністю для фібробластів, що може мати важливе значення в процесі відновлення пошкоджених тканин.

Катіонні білки - дефензіни і гістони - проявляють високу противобактеріальну і противірусну активність; ферменти активного кисню НАД-залежні флавіновіе оксидази генерують активні форми кисню (сінклетній O_2 , супероксидний O_2 , H_2O_2), які окислюють чужорідні внутрішньоклітинні включення; білок лактоферин знищує бактерії, конкуруючи з ними за залізо середовища.

Більшість зазначених факторів синтезується нейтрофилами і еозинофілами, моноцитами і діють в самій клітині, в її фагосомах або виділяються в кров і виконують свої функції поблизу лейкоцитів. Всі вони є елементами системи неспецифічного спадкового гуморального імунітету.

ЛЕКЦІЯ 7-8

МЕХАНІЗМИ СПЕЦИФІЧНОГО НАБУТОГО ІМУНІТЕТУ

1. Характеристика клітин, що беруть участь в реакціях специфічного імунітету.
2. Механізми реакції антиген-антитіло.
 - 2.1. Поняття терміна антиген, його загальна будова. Імуногенність ліпідів, вуглеводів, нуклеїнових кислот і білків.
 - 2.2. Класифікація антигенів.
 - 2.3. Механізм взаємодії антиген-антитіло.
3. Характеристика імунних реакцій.

Імунна система включає в себе не тільки перераховані вище малоспецифічні компоненти, але й елементи, що визначають високу специфічність імунних реакцій. Специфічність імунної реакції визначається лімфоцитами і продукує ними специфічними імуноглобулінами. Вміст лімфоцитів в крові людини в середньому становить $1-4 \times 10^9$ клітин в 1 л крові. Є два основних типи лімфоцитів, що володіють різними функціями: Т-лімфоцити, що забезпечують клітинний імунітет і В-лімфоцити, відповідальні за утворення антитіл. На відміну від інших імунокомпетентних клітин лімфоцити, що циркулюють в кровотоці, здатні до інтенсивної проліферації і диференціації у відповідь на антигенний стимул. Лімфоцити, що циркулюють в крові, є в основному зрілими клітинами, диференційованими на субпопуляції: Т-хелпери (помічники), Т-супресори, В-лімфоцити та ін. У відповідь на антигенне роздратування лімфоцити можуть, осідаючи в лімфоїдній тканині, активно розмножуватися і диференціюватися в кінцеві ефекторні клітини (в плазматичні клітини з В-лімфоцитів і цитотоксичні - з Т-лімфоцитів).

Після зникнення антигену гинуть клітини специфічних клонів, однак частина таких специфічних лімфоцитів, які представляють собою клітини, що живуть тривалий час, залишається. Ці лімфоцити обумовлюють імунологічну пам'ять до даного антигену, забезпечують при вторинній появі його в організмі більш інтенсивне за швидкістю розмноження з утворенням великої кількості специфічних клітин. Існування придбанної імунологічної пам'яті підтверджується наступним прикладом. Після первинного введення кролику правцевого анатоксину (бактеріальний екзотоксин, що втратив токсичність) проходить кілька днів, перш ніж в крові будуть виявлені антитіла, потім кількість їх зростає до максимуму і далі падає. При вторинному введенні препарату динаміка імунної відповіді різко змінюється: спостерігається швидша і інтенсивна продукція антитіл. Ця вторинна відповідь є результатом того, що лімфоцити можуть проліферувати значно швидше під впливом антигену.

Основна властивість набутого імунітету - його **специфічність** - обумовлена здатністю таких, що розпізнають, ділянок молекул антитіл розрізняти антигени. Антитіла, які реагують з анатоксином, що не зв'язуються, наприклад, з гемаглютинином вірусу грипу, і, відповідно, антитіла до вірусу грипу не взаємодіють зі столбнячним анатоксином.

Ця здатність упізнавати єдиний антиген і виділяти його серед інших має фундаментальне біологічне значення для розпізнавання «свого» та «чужого». Нездатність відрізнити «своє» від «не свого» може призвести до синтезу антитіл, взаємодіючих з компонентами власного організму (аутоантитіла), а це закінчується виникненням важких патологічних процесів. М. Бернет і Ф. Феннер припустили, що організм людини має механізм, що розрізняє «своє» і «не своє». На їхню думку, цей механізм полягає в тому, що компоненти організму, що циркулюють та потрапляють в лимфоїдну систему, яка розвивається в пренатальному періоді, «запам'ятовуються» як «свої». Потім по відношенню до них виникає постійна

нездатність до імунної відповіді, або толерантність. Це означає, що після завершення дозрівання імунної системи нездатність реагувати на «свої» компоненти стає нормою.

1. Характеристика клітин, що беруть участь в реакціях специфічного імунітету

Єдина загальноприйнята класифікація клітин, які забезпечують реакції специфічного імунітету, відсутня. На підставі функціональних особливостей виділяють кілька типів клітин:

▶ *антиген-представлені клітини* (АПК), які захоплюють антигени, переробляють їх і представляють відповідні антигенні детермінанти іншим імункомпетентним клітинам, (до АПК відносяться дендритні АПК, моноцити і макрофаги, а також В-лімфоцити);

▶ *ефекторні клітини*, які безпосередньо здійснюють реакції специфічного імунітету (відносяться цитотоксичні Т-лімфоцити і плазматичні клітини);

▶ *регуляторні клітини*, що забезпечують активацію або пригнічення окремих ланок імунних реакцій (активатори - індуктори Т-хелперів, індуктори Т-супресорів, Т-хелпери 1, Т-хелпери 2, макрофаги; інгібітори - Т-супресори;

▶ *клітини пам'яті*, які зберігають інформацію про взаємодію з конкретним антигеном і тим самим сприяють більш активному розвитку імунної відповіді при повторному його впливі.

Антиген - представлені клітини (АПК) розташовуються на головних шляхах надходження антигенів в організм (в шкірі і в слизових оболонках), звідки, захопивши антигени, вони мігрують в периферичні органи імунної системи, де представляють антигени лімфоцитів.

Функції АПК включають:

- 1) захоплення нативного (незмінного) антигенного матеріалу шляхом фагоцитозу, піноцитозу або ендоцитозу;
- 2) частковий протеоліз ендogenousного матеріалу в ендосомах протягом 30-60 хв;
- 3) синтез глікопротеїнових молекул головного комплексу гістосумісності і транспорт комплексу несумісності на поверхність АПК, де вони будуть представлені лімфоцитам для розпізнавання;
- 4) секрецію розчинних медіаторів, які викликають активацію лімфоцитів.

2. Механізми реакції антиген-антитіло.

Про те, що антитіла здатні зв'язувати антиген, відомо, можна сказати, з часу їх відкриття. Але повна картина такої взаємодії стала зрозумілою тільки в другій половині ХХ століття після з'ясування структури антитіл і їх антигензв'язуючих ділянок.

Як згадувалося вище, в безпосередню взаємодію вступають не будь-які ділянки антитіла та антигену, а чітко визначені: антигенна детермінанта і антигензв'язуюча ділянка. Вирішальним моментом в реалізації такої взаємодії є комплементарний збіг просторових конфігурацій цих елементів молекул, які зіштовхуються, тобто виступ на поверхні антигену (антигенна детермінанта) повинен відповідати за формою западині (ніші) між варіабельними доменами важкого і легкого ланцюга антитіла. Необхідність такої просторової відповідності диктується тим, що зв'язки, які виникають між утворюючими паратоп (поверхню ніші в антитілі) і епітоп (поверхню антигенної детермінанти) атомами, не є ковалентними і формуються тільки на дуже коротких відстанях. Такими зв'язками є: гідрофобні взаємодії, вандерваальсові сили, електростатичні взаємодії, водневі зв'язки, причому гідрофобне зв'язування забезпечує близько половини загальної енергії (сили) утримання молекул в комплексі.

2.1. Поняття терміна антиген, його загальна будова. Імуногенність ліпідів, вуглеводів, нуклеїнових кислот і білків.

Антиген - це органічна речовина біологічного походження, здатна викликати імунну реакцію. Антигеном може бути токсична і навіть нешкідлива для організму речовина, але, як правило, чужорідна для нього.

Власне слово «антиген» походить від широко використовуваних в сучасних мовах давньогрецьких анти - протилежний, і генез - породжує. Хто і коли застосував це слово для позначення агентів, що викликають у відповідь реакцію імунної системи, історія замовчує. Але, ймовірно, автори терміна мали на увазі те, що при введенні в організм хвороботворного початку (наприклад, патогенних бактерій) в організмі розвивається щось, що діє протилежним патогеному початку чином, оскільки результатом такої реакції є запобігання хвороби надалі. Тобто антиген - це що-небудь, що спричиняє народження собі протилежного.

У ранній період формування імунології під антигеном завжди однозначно розуміли організми або речовини, що мають відношення до інфекційних захворювань. Потім в результаті відкриття таких явищ, як продукція специфічних до речовин рослинного походження антитіл, гіперчутливість і відмінностей людей за групами крові, трактування цього терміна розширилося. В теперешній час термін антиген використовують в декількох значеннях, що мають загальну основу.

Чисто імунологічне сучасне трактування таке: **антиген - це агент, здатний викликати реакцію імунної системи і специфічно взаємодіяти (зв'язуватися) з продуктами цієї реакції.**

Фактично, щоб визнати яку-небудь речовину антигеном, необхідно підтвердити наявність у неї **трьох основних властивостей**: імуногенності, антигенності і специфічності. Оскільки кожен конкретний організм є нечутливим (імунотолерантним) по відношенню до власних антигенів, тобто в нормі (без патології) не відповідає трьом вище вказаним властивостям молекули, доводиться додавати до основних властивостей антигенів **четверте - чужорідність.**

З огляду на це під **імуногенністю** слід розуміти здатність викликати імунну відповідь при введенні у внутрішнє середовище іншого організму. **Антигенність** - це здатність вступати у взаємодію з продуктами імунної відповіді, викликані самою речовиною. **Специфічність** як властивість фактично впливає з двох попередніх - кожен антиген викликає свою імунну відповідь і це підтверджується тим, що взаємодії з продуктами викликаними іншим антигеном імунної відповіді, як правило, не спостерігається.

Речовини, що володіють всіма чотирма властивостями, прийнято називати **повними антигенами**. Необхідність введення цього поняття з'явилася в 30-ті роки ХХ століття, коли було виявлено, що деякі речовини мають антигени, але позбавлені імуногенності.

У антигені можна виділити дві частини - молекулу носія, імунологічно нейтральну високомолекулярну органічну сполуку з масою понад 10 кД, і розміщені на її поверхні кілька низькомолекулярних груп - **гаптенів**, які мають органічну або неорганічну природу і надають всій молекулі здатність викликати імунну відповідь. Термін «гаптен» був обраний не випадково - гаптена по грецьки означає «прикріплюю». Такі антигени називають повними на відміну від неповних антигенів, до яких відносяться речовини, зокрема гаптени, які самі не здатні викликати імунну відповідь, але набувають таку здатність після з'єднання з білком-носієм. Так, зокрема, низькомолекулярні речовини, потрапивши в організм, можуть набувати антигенних властивостей після їх з'єднання з макромолекулами цього організму. В такому випадку вони виступають в ролі гаптенів.

З цих експериментів були зроблені найважливіші і далекосяжні висновки. *По-перше*, стало зрозумілим, що імунна система впізнає не весь антиген відразу і цілком, а окремі його фрагменти. *По-друге*, антитіла взаємодіють не з усією молекулою антигену і не з будь-якою його ділянкою, а зі строго конкретною. *По-третьє*, для вироблення імунної відповіді і для взаємодії антигену з антитілом важлива просторова структура молекули антигену. *По-четверте*, для індукції імунної відповіді дійсно важливим є розмір молекули антигену.

Згідно з цими уявленнями молекула з антигенними властивостями повинна мати поверхневі, доступні для взаємодії з антитілами або рецепторами імунокомпетентних клітин ділянками. Ці ділянки отримали назву **антигенні детермінанти**, а їх зовнішня поверхня, здатна забезпечувати слабкі хімічні взаємодії з відповідною ділянкою антитіла або рецептора клітини, назву **епітоп**.

Детермінанта - це невелика частина молекули антигену (4-10 амінокислотних залишків), яка безпосередньо з'єднується з рецепторною зоною антитіла. У білковій молекулі антигену може бути кілька детермінант, причому вони можуть мати різну специфічність. Слід зауважити, що для антигенів полісахаридної природи (наприклад, аглютиноген системи АВО-груп крові) детермінанти організовані моноцукрами.

Антигени бувають видові, а у хребетних тварин також групові та індивідуальні, тканинні тощо. Крім того, у тварин різних видів відзначають антигени з однаковими антигенними детермінантами. Це **гетероантигени**. Так, антигену Ферсмана, який є в еритроцитах коней, собак, мишей, курей, відсутній у людини, мавп, кроликів, щурів, качок. Антигени групи крові А виявлені у вірусу грипу, що можна розглядати як пристосування вірусу до проникнення в організм людини.

Кількість антигенних детермінант прийнято називати **валентністю** антигену, а самі **антигени** в залежності від цієї властивості розділяти на **моновалентні, полі- і мультівалентні**. Різниця між полівалентними і мультівалентними антигенами базується на тому, що антигенні детермінанти однієї молекули можуть бути різними (полівалентність), або одна й та ж антигенна детермінанта може повторюватися кілька разів, як це характерно для полімерів регулярної будови (мультівалентність).

Якщо порівнювати між собою основні класи природних органічних речовин, то ліпіди мають найменш виражену імуногенність і антигенність.

Низькомолекулярні вуглеводи неімуногенні з такої ж причини, але навіть при значній масі полімерних вуглеводів їх антигенні властивості виражені дуже слабо.

Підтвердженням ролі саме просторової структури молекул є ліпополісахариди. Навіть при відносно невеликій молекулярній масі вони виявляють яскраво виражені антигенні властивості, що наочно проявляється при вивченні антигенних властивостей бактерій, у яких такі речовини входять до складу капсул або клітинних стінок.

Полімерні нуклеїнові кислоти, що мають найбільшу масу (наприклад, ДНК) також не є антигенами. Спочатку це здається дивним, тому що саме по послідовності нуклеотидів в ДНК все організми (за винятком однайцевих близнюків) і відрізняються один від одного. Але досить згадати просторову організацію молекули ДНК, і все стає зрозумілим: хоча азотисті основи нуклеотидів мають жорстку добре виражену конфігурацію, вони повернені в подвійній спіралі один до одного і фактично приховані всередині молекули, а зовнішня поверхня ДНК не має виражених антигенних детермінант.

Білки, будучи складними гетерополімерами, зі складною просторовою структурою, мають найбільш добре виражену антигенну характеристику. Саме для них була встановлена мінімальна молекулярна маса, що забезпечує імуногенність - 5 000. Саме вони мають максимально виражену антигенну валентність, яка зростає зі збільшенням молекулярних мас. Наприклад, у яєчного альбуміну (маса 44 000) валентність дорівнює 5, у тиреоглобуліну (650 000) - 40, у гемоціаніну (6 500 000) - 231.

Враховуючи значимість білкових молекул для життя практично всіх живих істот, їх різноманіття, яке існує в природі з початкових етапів розвитку життя, можна вважати, що імунні системи вищих тварин постійно еволюціонували і вдосконалювалися, перш за все, під впливом білкових антигенів. Тому саме до їх розпізнавання і видалення з організму імунна система найбільш пристосована.

2.2. Класифікація антигенів.

Класифікувати антигени можна по:

А) їх відношенню до організму, в якому вони викликають імунну відповідь. При такому підході прийнято виділяти:

- **аутоантигені** - власні антигени організму, на які з тих чи інших причин відреагувала імунна система. Як правило, така реакція призводить до імунопатологічних станів;
- **ізоантигені** - антигени генетично ідентичних організмів;
- **гомо- (ало-) антигени** - антигени різних осіб одного й того ж виду;
- **гетеро- (ксено-) антигени** - антигени осіб будь-якого іншого виду;
- **комплексні антигени** - виникають як результат об'єднання своїх і чужорідних молекул.


Б) за структурною організацією антигенів їх прийнято ділити на дві групи: так звані **розчинні** антигени і **корпускулярні** (партікулізовані) антигени. До першої групи входять всі антигени, представлені власне молекулами, причому будь-якої складності. Друга складається імуногенних агентів, складених з безлічі різних молекул (фрагменти клітин або вірусів, що не зруйновані, вірусні частинки або клітини мікроорганізмів, клітини інших вищих організмів). Природно, при попаданні корпускулярних антигенів в організм, в ньому розвивається кілька імунних відповідей на конкретні складові такої антигенної молекули. Важливим є те, що сукупність таких відповідей забезпечує кінцевий результат - видалення з організму чужорідного агента, наприклад хвороботворні бактерії.

В) можливо класифікувати антигени за ефектом, який вони надають на організм. Зокрема, агенти, що викликають після первинного потрапляння в організм відсутність реакції імунної системи на наступні контакти організму з ними (толерантність), називають **толерогенами**. Агенти з протилежною дією, тобто такі, що викликають підвищену реактивність організму при вторинному попаданні, найчастіше називають **алергенами**.

2.3. Механізм взаємодії антиген-антитіло.

Антитіло - це білкова молекула, яка специфічно взаємодіє з відповідним антигеном. Всі антитіла належать до гамма-глобулінів сироватки крові. Функція імуноглобулінів дуже добре виражена тільки у птахів і ссавців.


Структурно імуноглобулін (антитіло) складається з великої білкової молекули, в якій є відносно невелика (до 20 амінокислот) активна відмінна група - *рецептор*. Рецептор забезпечує специфічність цього антитіла. Вона заснована на високій відповідності (комплементарності) до структури активного центру антитіла і детермінантних груп антигену, причому відповідність повинна бути не тільки в просторової конфігурації амінокислотних радикалів обох взаємодіючих молекул, але й в їх електричних зарядах (мал. 16.).



Мал. 16. Взаємодія антигену з антитілами

Процес розпізнавання визначається слабкими міжмолекулярними (ван дер ваальсовими) взаємодіями, які діють на дуже малих відстанях між молекулами. А останнє можливо лише при повній відповідності відмінної частини антитіла детермінантам антигену. Специфічний імунітет полягає в тому, що кожній антигенній детермінанті відповідає певне і лише одне антитіло, проводиться групою (клоном) лімфоцитів. Якщо культуру тканини вирощувати з одного лимфоцита і змусити її робити антитіла, то всі утворені молекули антитіл будуть проти одного антигену - це *моноклональні антитіла*.

Внаслідок контакту антитіла з відповідним антигеном утворюється міцний комплекс антиген-антитіло, в якому антиген втрачає свої патогенні властивості, нейтралізується або знищується. В результаті можливі різні наслідки, які перш за все залежать від валентності взаємодіючих молекул, тобто від кількості детермінантних груп антигену і рецепторних груп антитіла. В антигені їх може бути багато, тоді як антитіло має одну або дві рецепторні групи. У разі, якщо реагуючі компоненти мають по одній контактній групі (мал. 17 а), об'єднання комплексу антиген-антитіло в групи не відбувається і зовнішніх проявів імунної реакції не буде. При наявності двох рецепторних груп в антитілі і декількох детермінант на антиген можуть утворюватися великі групи молекул: відбувається їх склеювання, осадження і т.д.



Мал. 17. Форми комплексів антиген-антитіло:

1- антиген; 2- антитіло; антитіло має одну контактну групу (рецептор) (в); антиген - дві (б), три (в), шість (г) детермінантних груп

Аналізуючи взаємодію антиген-антитіло, можна відмітити деякі особливості.

1) Вона може реалізуватися тільки в середовищі електrolітів, оскільки

частина описаних вище зв'язків між епітопом і паратопом виникають тільки в умовах, що забезпечують формування поверхонь несучих заряди. У внутрішньому середовищі організму тварин такі умови реально присутні, але при постановці реакцій антиген-антитіло *in vitro* це необхідно враховувати.

2) Оптимальною концентрацією іонів солей для таких реакцій є концентрація 0,85%, а іонна сила розчинів повинна бути в межах 0,5-0,1. Значне підвищення концентрації солей призводить до розпаду комплексів антиген-антитіло, зокрема, 15% розчин NaCl використовують для отримання компонентів реакції у вільному стані.

3) Оптимальний інтервал значень рН - 6,4-8,6. При змінах рН до значень більше 9,0 або менше 5,0 відбувається зсув реакції в сторону дисоціації комплексів, що також використовується при виділенні антитіл або антигенів.

4) Оптимальною для взаємодії температурою є 37 °С, але утворення комплексів антиген-антитіло відбувається досить ефективно і при більш низьких температурах. Наприклад, орієнтовочні реакції аглютинації ставлять при кімнатній (18-20°С) температурі. Підвищення температури на кілька градусів (до 40°С) не позначається на ефективності взаємодії, але більш високі температури (60°С) стимулюють розпад комплексів антиген-антитіло, що також можна застосувати для отримання чистих фракцій антигену або антитіла. Вважається, що температурний параметр реакції більшою мірою залежить від антитіл, ніж від антигенів, оскільки у ссавців, і зокрема у людини, виявлені так звані холододі антитіла. Вони взаємодіють з антигенами тільки при температурах нижче 37°С.

5) При постановці реакцій антиген-антитіло *in vitro* ощутимі результати реагування проявляються не відразу після змішування розчинів реагентів, а після закінчення певного часу. У зв'язку з цим реакцію антиген-антитіло умовно поділяють на фазу взаємодії і фазу прояви. Умовність такого поділу полягає в тому, що власне взаємодія між паратопом і епітопом, при їх правильному розташуванні один щодо одного, здійснюється миттєво, однак до фази прояви може проходити від декількох хвилин до декількох діб. Слід також пам'ятати, що в залежності від властивостей і концентрацій, взятих до реакції антитіл і антигенів прояви результатів взаємодії можуть мати відчутні відмінності.

Агрегування антигенів і антитіл має значення не тільки при постановці реакцій *in vitro*. Наявність в молекулі імуноглобулінів як мінімум двох ідентичних антигензв'язуючих фрагментів явно не є випадковістю. Аглютинація, яка відбувається в організмі, підсилює іммобілізацію чужорідних агентів, що активно рухаються (наприклад, бактерій) і значно прискорює їх знищення шляхом фагоцитозу. Те ж саме можна віднести і до чужорідних молекул, що рухаються дифузійно (наприклад, що володіють антигенними властивостями токсинів), які, входячи до складу преципітата, як правило, втрачають шкідливі для організму властивості і з більшою ймовірністю виявляються і знищуються фагоцитами. В обох випадках буде мати місце найбільш ефективний імунний фагоцитоз, при якому досить взаємодії однієї, що входить до агрегату імуноглобулінів з рецепторами, фагоцитуючої клітини, щоб всі, чужорідні агенти в агрегаті були знищені.

3. Характеристика імунних реакцій

Серед імунних реакцій найбільш вивчені такі.

Реакція преципітації - осадження комплексу антиген-антитіло в результаті агрегації окремих комплексів в великі частки і випадання в осад. Розчин при цьому каламутніє.

Реакція аглютинації - склеювання часток (бактерій, клітин або їх часток) відповідним антитілом. В результаті утворюються великі скупчення - грудки часток, помітні неозброєним оком, як, наприклад, при аглютинації еритроцитів в плазмі несумісної групи крові. Реакція аглютинації, як і попередня, здійснюється за участю бівалентних (повних) антитіл.

Найбільш показовими в плані візуалізації є саме ці дві реакції - аглютинації і преципітації, при яких утворюються фіксовані неозброєним оком агрегати, що складаються з безлічі одиниць антигенів і антитіл.

Власне феномен аглютинації (преципітації) полягає в наступному. При випадкових зіткненнях антигенів і антитіл в розчині можливі ситуації, коли одна молекула антитіла приєднується однією із своїх антигензв'язуючих ділянок до антигенної детермінанти на одній антигенній частці, а другим - до такої ж, але розташованій на іншій частці. Тим самим дві такі антигенні частки виявляються

пов'язаними в агрегат. Оскільки антигени в такому агрегаті полівалентні, можлива реалізація за такою ж схемою взаємодії з новими молекулами антитіл, а значить, укрупнення вже існуючих агрегатів і поступове випадання їх в осад. Характер випадуючого осаду, перш за все, залежить від властивостей антигенної частинки. Чим більші розміри вона має, тим коротше буде фаза взаємодії і тим більш вираженим буде осад. Крім того, важливим є кількість доступних для зв'язування антигенних детермінант. При наявності двох детермінант утворюються агрегати у вигляді ланцюжків або невеликих кілець (слабо видимий осад, що повільно утворюється). При збільшенні кількості детермінант зростає ймовірність утворення агрегатів у вигляді тривимірних решіток (сіток), що мають набагато більші розміри. Відповідно швидкість утворення і вираженість опадів збільшуються.

Істотним для прояву результатів аглютинації і преципітації є і склад антитіл, що беруть участь в реакції. Якщо суспензія антитіл включає антитіла різної специфічності, а антиген має кілька різновидів комплементарних цим антитілам антигенних детермінант, ймовірність утворення опадів зростає. Тому так звані поліклональні антитіла, отримані з сироваток імунізованих конкретним полівалентним антигеном тварин, є кращими в подібних реакціях, ніж ті моноклональні антитіла, що володіють тільки одним типом специфічності.

Всі описані вище особливості в рівній мірі стосуються і аглютинації і преципітації, оскільки принципових відмінностей між ними немає. Застосування цих двох термінів склалося історично і зберіглося, швидше, як данина традиціям. *Аглютинацією прийнято вважати осадження антитілами корпускулярних антигенів* (клітин, вірусних частинок, або фрагментів їх молекул), *преципітацією - осадження молекул, що володіють антигенними властивостями*.

Реакція лізису - розчинення клітин або їх компонентів під впливом специфічних антитіл. Ця реакція, як правило, виникає після аглютинації клітин і відбувається при обов'язковій участі комплементу - сукупності багатьох неспецифічних білкових факторів сироватки крові, здатних посилювати імунні реакції.

У макроорганізмі описані вище імунні реакції відбуваються в певній послідовності і тісному взаємозв'язку. В результаті здійснення складного комплексу тих чи інших реакцій розвивається імунна відповідь, яка призводить до знищення (елімінації) антигену.

При нормальних умовах в організмі не має антитіл до власних антигенів. Вироблення таких антитіл – аутоантитіл - є явище неприродне. Воно спостерігається найчастіше у відповідь на появу власних антигенів, змінених під впливом різних факторів: токсинів, вірусів, бактерій, хімічних або фізичних (лікарських засобів, опромінення, опіку тощо), або після деяких захворювань, наприклад, антикардіальні антитіла у хворих після повторного інфаркту міокарда. Такі антитіла провокують або підсилюють патологічний процес і таким чином втрачають свою захисну спрямованість. Ще одним відхиленням в функції імунної системи є алергічна реакція.

Біологічне значення реакцій антиген-антитіло складається в знешкодженні патогенного агента і підтримці нормального функціонування макроорганізму. Однак в деяких випадках розвивається підвищена чутливість (гіперсенсibiliзація) організму до якогось антигену, іноді навіть біологічно нейтрального - запаху якоїсь рослини, розчину нешкідливої речовини тощо. І тоді вторинна імунна відповідь може бути настільки інтенсивною, що може завдавати шкоди цьому організму. Розвивається алергічна реакція: утруднення дихання внаслідок бронхоспазму, почервоніння і висипання на шкірі, відчуття свербіжу. У таких випадках вдаються до пригнічення імунної системи організму лікарськими засобами. Також цей прийом використовують, щоб запобігти відторгненню пересаженого людині органу, адже повної імунної сумісності органів донора і реципієнта практично досягти не вдається.

Прояв імунної відповіді специфічної імунної системи є різноманітним. У разі, якщо мутировавша клітина організму набуває властивостей, відмінних від властивостей генетично притаманних йому клітин (наприклад, пухлинні), Т-кілери вражають клітини самостійно, без втручання інших елементів імунної системи. В-кілери також самостійно знищують розпізнані антигени, покриті нормальними антитілами. Повна імунна відповідь виникає проти деяких антигенів, вперше потрапивши до організму. Макрофаги, після фагоцитозу таких антигенів вірусного або бактеріального походження, не можуть їх повністю переварити і через деякий час викидають. Антиген, що пройшов через фагоцит, несе на собі позначку, яка свідчить про його «неперетравлюваність». Фагоцит таким чином готує антиген до «подачі» в систему специфічного імунного захисту. Він розпізнає антиген і відповідним чином його позначає.

Таким чином, специфічна імунна відповідь передбачає різні випадки взаємодії антигену і імунної системи. У ньому беруть участь комплемент, який готує антиген до фагоцитозу, фагоцити, обробтані антигеном та подані лімфоцитам, Т- і В-лімфоцити, імуноглобуліни та інші складові. В процесі еволюції виробилися різні сценарії боротьби з чужорідними клітинами. Ще раз слід підкреслити, що імунітет є складною багатоелементною системою. Але, як і будь-яка складна система, імунітет має недоліки. Дефект одного з елементів призводить до того, що може відмовити вся система. Виникають хвороби, пов'язані з імунодепресією, коли організм не може самостійно протидіяти інфекції.

ЛЕКЦІЯ 9

ІМУНІТЕТ К ІНФЕКЦІЙНИМ ХВОРОБАМ

1. Поняття вродженого і набутого імунітету
2. Поняття природного і штучного імунітету. Види вакцин і вакцинних препаратів
3. Шляхи отримання трансгенних організмів для виробництва вакцинних препаратів.

1. Поняття вродженого та набутого імунітету

У сучасному розумінні імунітет до інфекційних захворювань слід розділяти на **вроджений (він же спадковий або видовий) і набутий (або індивідуальний)**. Такого роду поділ базується на наступному. Будь-яка викликана інфекційним початком хвороба з біологічної точки зору являє собою випадок симбіозу, тобто триваючого якийсь час співжиття як мінімум двох організмів, один з яких (так званий господар) є середою існування для іншого. Причому, оскільки мова йде про хворобу, таке співжиття для господаря несприятливе, і такого роду симбіоз слід розцінювати як паразитизм, а збудника хвороби слід називати паразитом. Всі випадки паразитизму, які нам доводиться спостерігати в навколишньому середовищі, представляють собою результат тривалої спільної еволюції видів, що колись вступили в симбіотичні взаємини, і інфекційні хвороби в даному випадку не є винятком.

Як вже згадувалося вище, більшість видів високоорганізованих тварин мають захисні фактори, що перешкоджають заселенню свого внутрішнього середовища будь-якими іншими організмами. Придбання та вдосконалення цих факторів в ході еволюційного процесу організмів-господарів призвело до того, що багато видів, які прагнуть до колонізації і використання інших організмів, втрачали здатність вражати організми, що раніше служили їм господарями. Але, з іншого боку, еволюція паразитичних видів, що проходила при постійному контакті з видами-господарями, призвела до вдосконалення факторів патогенності і вірулентності паразитів.

Тому всі спостережувані нами поєднання господар-паразит відрізняються, *по-перше*, високим ступенем специфічності, а *по-друге*, є прикладом досягнутої в ході еволюції рівноваги між захисними факторами господаря і факторами патогенності і вірулентності паразита. Умовно кажучи, якщо б в тривалій багатовіковій боротьбі господаря і паразита перемаг будь-який з протидіючих партнерів, це призвело би до зникнення в ході еволюції будь-якого з даних видів, і ми б не мали можливості спостерігати таке поєднання як інфекційне захворювання. Ймовірно, саме з таких позицій можна пояснювати несприйнятливність, наприклад, людини, як *Homo sapiens*, до багатьох хвороб, що вражають інші види ссавців. Такий імунітет і прийнято вважати **вродженим або видовим**, оскільки будь-яка особина даного виду захищена від паразитів інших видів особливостями, що виникли в ході еволюції саме даного виду.

Поняття ж **набутого імунітету** стосується захисту від тих паразитів, які здатні долати конститутивні захисні бар'єри (непроникність покривів, фагоцитоз, комплемент, запалення) організмів конкретного виду. Причому такого роду захист виникає вже тільки в результаті контакту з інфекційним початком і у кожної особини даного виду незалежно від інших, тому його і називають індивідуальним. У формуванні такого імунітету основну роль відіграють спеціальні захисні фактори і саме тут найбільш повно проявляють себе особливості спеціалізованої системи організму, яку називають імунною.

2. Поняття природного і штучного імунітету. Види вакцин і вакцинних препаратів.

Базуючись на данні медицини, мікробіології та імунології, люди отримали можливість напряду викликати набутий імунітет до інфекційних захворювань, тому в теперешній час його прийнято ділити на природний і штучний. Штучний імунітет можна викликати двома основними шляхами.

Перший передбачас забезпечення контакту з хвороботворним початком. Він здійснюється таким чином, щоб імунна система отримала можливість специфічно на нього відреагувати, але при цьому в організмі не розвинулися симптоми захворювання в тій мірі, яка характерна для хвороби, що виникає природним шляхом. В ідеалі вакцини - препарати за допомогою яких створюють штучний імунітет - взагалі не повинні викликати у вакцинованих будь-яких небажаних реакцій, проте не всі з вироблених в даний час вакцин відповідають цій вимозі.

Сучасні вакцинні препарати, які застосовуються у ветеринарії та медицині для профілактики або лікуванні, прийнято умовно ділити на кілька груп. Перш за все, це так звані **живі вакцини**, що містять життєздатні хвороботворні мікроорганізми, але такі їх варіанти, які не здатні викликати захворювання. Серед таких препаратів, що застосовувалися в практиці вакцинації відомі так звані гетеро- і *гомологічні живі вакцини*. Прикладами гетерологічних вакцин є вакцинні препарати Е. Дженнера і протитуберкульозні вакцини на основі збудника мишачого туберкульозу. В обох випадках в організм людей при щепленні вводили мікроорганізми, що викликають подібні захворювання у інших ссавців - корів і мишей відповідно. Під гомологічними живими вакцинами розуміють штами мікроорганізмів, що відносяться до патогенного для людини виду, але мають більш низький ступінь патогенності і вірулентності в порівнянні зі звичайними штамми. Отримати такі аттенюйовані (тобто ослаблені по вірулентності) штами можна або шляхом пасирування через організм малосприйнятливого господаря, або шляхом тривалого культивування на поживних середовищах без контакту з господарем, або шляхом відбору спонтанних або індукованих мутантів вихідних високовірулентних форм. При цьому в ході отримання придатного для вакцинації штаму необхідно так провести ослаблення вірулентності, щоб не сталося зникнення або значного ослаблення імуногенності, тобто, здатність викликати імунну відповідь. Слід відмітити, що саме за здатністю спричиняти добре виражену імунну відповідь живі вакцини перевершують всі інші вакцинні препарати. Поясненням цьому, ймовірно, є збереження живою клітиною або вірусною частинкою більшості антигенів, на які здатна реагувати імунна система, що і робить імунну відповідь найбільш широкою по набору антитіл і клітин імунологічної пам'яті і, отже, більш повноцінною.

Другу групу складають препарати, що містять не зруйновані, але позбавлені життєздатності клітини або вірусні частки збудника, так звані **вбиті вакцини**. Для їх отримання стараються застосовувати такі способи умертвіння мікроорганізмів (нагрівання, обробка певними хімічними речовинами), які б не руйнували їх основні антигени. Природно, що в кожному конкретному випадку при розробці того чи іншого препарату доводиться емпірично підбирати умови обробки, що обумовлено особливостями будови антигенів різних збудників. Такі вакцини вважаються більш безпечними, оскільки в порівнянні з вакцинами першої групи викликати захворювання навіть у осіб з послабленим імунним статусом вони не здатні.

Однак і у цих препаратів є свої недоліки:

- ▶ по-перше, імунітет що виникає після їх введення, зазвичай менш тривалий і є більш слабким по напруженості (інтенсивності), ніж після введення вакцин першої групи;
- ▶ по-друге, більшість таких вакцин може давати небажані побічні ефекти, особливо у осіб, схильних до алергічних реакцій.

Для запобігання такого роду небажаних ефектів, ще на початку ХХ століття було запропоновано хімічно очищати препарати вбитих і зруйнованих бактеріальних клітин або вірусних часток від так званих баластних (тобто необов'язкових для вироблення потрібної імунної відповіді) компонентів. Це призвело до появи ще двох груп вакцинних препаратів.

Перш за все, базуючись на проведених в кінці ХІХ століття дослідженнях медиків і мікробіологів, імунологи прийшли до висновку, що при деяких захворюваннях основне ураження організму-господаря виникає під дією конкретних речовин, вироблених патогеном – токсинів - і що для захисту організму від даної хвороби досить вироблення їм антитіл саме проти таких токсинів. Експерименти, в яких організмам в невеликих дозах вводили очищені препарати токсину, підтвердили правильність такого напрямку, і подальші дослідження привели до створення особливої **групи вакцин**, так званих **анатоксинів**. Це препарати, які використовуються для вакцинації та містять особливим чином оброблений очищений токсин, причому його обробка повинна проводитися таким чином, щоб токсин втратив свої токсичні властивості (звідси назва: приставка «ана» позначає в даному випадку заперечення, тобто «нетоксин»), але обов'язково зберіг імуногенність, тобто здатність викликати імунну відповідь.

Однак не у всіх випадках симптоми захворювання пов'язані тільки з токсинами і для вироблення повноцінної імунної відповіді необхідно вироблення антитіл проти конкретних антигенів бактеріальних клітин або вірусних часток. Після очищення і концентрації таких конкретних антигенів, і створюють вакцини **четвертої групи**. Оскільки при виготовленні таких препаратів застосовують методи хімічного очищення речовин, такі вакцини традиційно називають в російськомовній літературі хімічні. Хоча такі вакцини, на жаль, коштовні у виробництві, їх безпека та найменша здатність викликати небажані побічні ефекти робить ці вакцини найбільш переважними для застосування.

В кінці ХХ століття завдяки розвитку генетичної інженерії з'явилися нові можливості отримання таких вакцин. Особливі труднощі в отриманні будь-яких вакцинних препаратів створює обов'язкове забезпечення найсуворіших заходів безпеки при роботі з патогенами. Тому можливості клонування генів, що контролюють виробку основних антигенів хвороботворних бактерій або вірусів та перенесення їх в інші організми відкривають величезні перспективи. Отримання рекомбінантних (трансгенних) організмів, що синтезують основні антигени збудники, значно б спростило і здешевіло виробництво вакцинних препаратів.

3. Шляхи отримання трансгенних організмів для виробництва вакцинних препаратів

Дослідження такого роду інтенсивно проводяться в багатьох країнах і тут можна виділити декілька основних напрямків.

1. **Перше** - це отримання трансгенних одноклітинних (бактерій і дріжджів) організмів, в клітинах яких домагаються підвищення експресії генів хвороботворних бактерій або вірусів.

2. **Друге** - це отримання рекомбінантних вірусів на основі вірусів рослин і вірусів, що викликають захворювання у людини або тварини. Багато, щоб такі гібридні вірусні штами зберігали здатність репродукуватися в клітинах рослин, але при цьому не викликали у рослини серйозного захворювання і, звичайно ж, забезпечували синтез антигенів вірусів, патогенних для ссавців. Розмноження таких гібридних вірусів в рослинах і подальше виділення вже з рослинного матеріалу потрібних для створення вакцини антигенів дає можливість отримання найбільш дешевих вакцинних препаратів.

3. **Третій** напрям передбачає отримання трансгенних рослин, здатних синтезувати потрібні антигени. З біомаси таких рослин також можна отримувати вакцинні препарати різного призначення або ж, якщо антиген може викликати імунну відповідь при пероральному (через рот) введенні, такі рослини можна буде вживати в їжу не тільки як продукт харчування, а й як вакцинний препарат.

Оскільки широкомасштабна вакцинація населення і сільськогосподарських тварин вимагає значних витрат не тільки на виробництво препаратів, але й на їх застосування (мається на увазі оплата праці медиків і ветеринарів), ведуться розробки так званих комплексних вакцин, що містять антигени різних хвороботворних мікроорганізмів. Так звані ди-, три- і полівакцини вже мають застосування, і проводиться постійна робота по створенню нових подібних препаратів.

Штучний імунітет створений за допомогою вакцин називають **активним**. Оскільки в організмі в результаті вакцинації розвинулась імунна відповідь та зберігаються клітини імунної пам'яті, то при наступних контактах з таким же збудником організм відповідає виробленням антитіл. Така форма імунітету, як правило, зберігається протягом декількох років.

Друга ж форма штучного імунітету створюється шляхом введення в організм вже готових, вироблених в іншому організмі антитіл проти конкретного збудника. Цей імунітет зберігає свою ефективність, як правило, близько місяця, оскільки введені антитіла поступово руйнуються в плазмі крові, а власних антитіл, здатних захистити від даного збудника, організм не виробляє. Тому такий штучний імунітет, створений за допомогою препаратів, що містять антитіла (їх зазвичай називають сироватками) називають **пасивним**.

Отримання сироваток, придатних для створення штучного пасивного імунітету, здійснюють найчастіше шляхом проведення за спеціальною схемою тривалої імунізації тварин збудником будь-якого захворювання людини. Можливо також отримання сироваток з донорської крові високоімунних по відношенню до конкретної хвороби людей, однак такі сироватки виготовляють значно рідше.

Для профілактики інфекційних хвороб застосовують обидві форми штучного імунітету, але активний штучний імунітет має набагато більш широке поширення. Більш ніж столітня історія застосування масових щеплень (так традиційно називають медики введення вакцин) наочно показала, що імунізація населення за допомогою вакцин є найкращим способом боротьби з хвороботворними мікроорганізмами. Оскільки більшість збудників хвороб - це облігатні паразити. Шляхом створення штучного активного імунітету у більшості людей можна домогтися такої ситуації, коли ймовірність поширення та підтримки такого виду буде мізерно мала або ж взагалі неможлива. За даними епідеміологів, загроза епідемії зникає після досягнення імунітету у 75% населення, а більш високий відсоток імунних людей може призвести до повного зникнення збудника того чи іншого інфекційного захворювання як виду. Прикладами ефективності такого підходу може служити відсутність в даний час епідемії віспи та поліомієліту, раніше наносивших величезну шкоду людству.


З метою профілактики інфекційних хвороб пасивний штучний імунітет створюють, як правило, тільки у певного контингенту осіб, які змушені по службі або в силу обставин, що складаються, контактувати з хвороботворним початком (лікарі, обслуговуючий персонал медичних закладів, працівники відповідних науково-дослідних лабораторій і виробництв). Можуть також отримувати ін'єкції сироваток і люди, які вимушені контактували з хворими під час спалаху, наприклад, родичі і сусіди хворих.

Природний імунітет виникає без втручання людини також представлений двома формами. Так **званий постінфекційний імунітет** виникає після перенесеного захворювання. Він забезпечує несприйнятливість до деяких хвороб, або, має в своїй основі розвиток у хворого імунної відповіді, що призводить до формування і тривалого (іноді на все життя) збереження в організмі відповідних клітин імунної пам'яті. Фактично те, чого медики намагаються досягти шляхом вакцинації, в даному випадку відбувається природним шляхом. Така форма захисту організму іменується **природним активним імунітетом**.

Аналогічно природний пасивний імунітет може виникати як результат потрапляння у внутрішнє середовище організму антитіл, які продукуються іншим організмом. Єдиною ситуацією, коли можливо природне проникнення антитіл з одного організму в інший, є період внутрішньоутробного розвитку у ссавців. Встановлено, що імуноглобуліни класу G здатні долати плацентарний бар'єр і переміщатися з

материнського організму в кров плоду, який розвивається. Якщо концентрація певних антитіл виявляється досить високою, то після народження, до тих пір, поки ще зберігаються материнські антитіла, немовля може не сприймати конкретне захворювання. Необхідно відзначити, що в медичній літературі досить часто такий імунітет називають вродженим, чого за сучасними уявленнями робити не слід, оскільки дана форма залежить від імунного статусу матері і проявляється не у кожного новонародженого, тобто відноситься не до видового, а до індивідуального імунітету. Набагато більш вдалою і найбільш поширеною в даний час другою назвою природного пасивного імунітету слід вважати термін **плацентарний імунітет**.

Підсумовуючи викладену в цьому розділі інформацію, можна навести таку схему співвідношення форм імунітету до інфекційних захворювань (мал. 18)



Мал. 18. Схема співвідношення форм імунітету до інфекційних захворювань (Песнякевич А.Г., 2007)

ЛЕКЦІЯ 10

ІМУННИЙ СТАТУС. ІМУНОДЕФІЦИТНИЙ СТАН

1. Загальні закономірності функціонування імунної системи.
2. Поняття імунного статусу і його основні характеристики.
3. Імунодефіцити.
 - 3.1. Вроджені імунодефіциту.
 - 3.2. Придбані імунодефіцити.
 - 3.3. Аутоімунні захворювання.
 - 3.4. СНІД.

1. Загальні закономірності функціонування імунної системи

Порушення механізмів реалізації імунної відповіді призводить до різних патологій імунітету, небезпечним для здоров'я і життя. Найбільш часто зустрічається форма такої патології - імунологічна недостатність, або відповідно до загальноприйнятої міжнародної термінології імунодефіцитний стан.

Коротенько розглянемо загальні закономірності функціонування імунної системи.

По-перше, ефективність роботи імунної системи *заснована на балансі її компонентів*. Кожен компонент імунної системи в значній мірі повторює функції інших компонентів. Таким чином, дефект частини компонентів імунної системи часто може бути компенсованим іншими її компонентами. Тому, якщо у людини є дефект будь-якого імунного компонента, як допоміжний засіб необхідно використовувати препарати, що покращують метаболізм клітин.

По-друге, клітини імунної системи здійснюють свої основні *функції в активному стані*. Головним стимулом для активізації всіх клітин імунної системи є антиген. Але існують ситуації, коли антиген виступає в ролі переважного фактора. Наприклад, відомий феномен так званих ледачих лейкоцитів, які недостатньо активно реагують на чужорідний субстрат.

По-третьє, ступінь активізації імунної системи *пов'язана з рівнем сукупності її компонентів*. У здорових людей кількість і інтенсивність взаємозв'язків між компонентами імунної системи зазвичай мінімальні. При виникненні запального процесу під час активної роботи імунної системи їх кількість різко зростає. В разі позитивного результату (після одужання) взаємозв'язок компонентів знову знижується. Хронічний же процес характеризується підтримкою високого рівня сукупності імунних компонентів (в основному в кілька разів більше, ніж у здорових людей), що розцінюється як синдром напруженості імунної системи. Це пояснюється тим, що за даних обставин імунна система продовжує активно боротися з чужорідним агентом, підтримуючи його на певному компенсованому рівні, але не здатна повністю його ліквідувати. Загострення хронічного процесу можна пояснити зривом ефективної роботи імунної системи після тривалого напруження.

2. Поняття імунного статусу і його основні характеристики

Характеристику **стану імунної системи організму, виражену якісними і кількісними показниками її компонентів, називають імунним статусом (імунограма)**. Визначення імунного статусу проводять з метою встановлення вірного діагнозу і підбору методів лікування. Виявлені зміни імунітету оцінюються не ізольовано, а в комплексі з індивідуальними особливостями стану людини і даними інших досліджень.

Таким чином, імунний статус визначає в сумі індивідуальну реактивність організму і відображає ті межі взаємодії з навколишнім середовищем, за якими нормальна реакція перетворюється в патологічну. Будь яке гостре захворювання не є наслідком того, що в навколишньому середовищі є всілякі хвороботворні бактерії. Якби це було так, то люди постійно хворіли б. Але хворіють тільки ті, хто реагує на певний вид бактерій, патологічний для нього.

Якщо виходити з цього, то можна сказати про три рівні реактивності організму, таких як: **толерантність, резистентність і імунітет**.

Толерантний організм не має захисту від патологічних чинників. Відсутність захисту призводить до руйнування організму і смерті. Це відбувається при імунодефіцитах.

Резистентний організм при зустрічі з патологічним агентом реагує включенням імунної системи для боротьби з ним. Результат цієї боротьби буде залежати від потужності захисних механізмів, кількості і якості патогена. Ця боротьба проявляється як патологічний процес.

Імунний організм взаємодіє зі збудником, і результат його реакції - це знищення збудника на рівні нормального захисту організму. Але такий розподіл дуже умовний і відносний. Наприклад, організм, толерантний до одного антигену, може бути резистентним до іншого і імунним до третього. Крім того, існують і проміжні види реакцій. Це відноситься до хронічних захворювань, коли захисні сили імунітету не можуть остаточно знищити антиген, але в той же час не надають йому можливості зруйнувати хворий орган або тканину. Ця боротьба йде зі змінними успіхами, тобто періоди ремісії (одужання) змінюються періодами загострення хронічного захворювання.

Таким чином, в боротьбу з патогеном включаються всі вищі рівні організму, в тому числі системи життєдіяльності. Організм в цьому випадку працює на межі. Компенсаторні реакції можуть досягти такої сили, що починають уражатися системи життєзабезпечення. Наприклад, при лихоманці температура тіла в результаті термічних реакцій може перевищити допустиму і стати причиною смерті. У цьому випадку смерть є ціною адаптації. Це лише одиничний приклад, але й він показує, як важливо для організму мати хороший імунологічний статус.

Дослідження імунного статусу включає в себе:

- 1) визначення групи крові і резус-фактору;
- 2) загальний аналіз крові з розгорнутою лейкограмою або формулою;
- 3) визначення кількості імуноглобулінів;
- 4) дослідження лімфоцитів;
- 5) дослідження фагоцитарної активності нейтрофілів.

Крім цього, існують два етапи імунологічної діагностики. Перший етап виявляє «грубі» дефекти в імунній системі. Дослідження проводять за допомогою простих, так званих орієнтовних методів. Це тести першого рівня. Цим методом визначають двадцять показників: кількість лейкоцитів, лімфоцитів, різноманітних підгруп Т-лімфоцитів, рівні імуноглобулінів (Jg) А, М, J, Е, концентрацію циркулюючих імунних комплексів та ін. На цьому етапі враховуються кількість клітин, їх процентне співвідношення і функціональна активність.

На другому етапі, якщо були виявлені відхилення в орієнтовних тестах проводиться більш ретельний аналіз стану імунітету. Тести другого рівня дозволяють простежити зміни в змісті складних речовин, що беруть участь в регуляції імунної відповіді (наприклад, інтерлейкіну), а також кількість клітин, які несуть певний вид імуноглобулінів.

Слід докладніше зупинитися на розшифровці показників імунограми.

Лейкоцити

Норма - $3,5-8,8 \times 10^9/\text{л}$. Підвищення числа лейкоцитів - це **лейкоцитоз**, зниження - **лейкопенія**. Лейкоцитоз ділиться на *фізіологічний і патологічний*. Причинами фізіологічного лейкоцитозу можуть бути прийом їжі (при цьому кількість лейкоцитів не перевищує $10-12 \times 10^9/\text{л}$), фізична робота, прийом гарячих і холодних ванн, вагітність, пологи, передменструальний період. З цієї причини кров слід здавати натще і перед цим не займатися важкою фізичною роботою. Для вагітних, породіль, дітей встановлені свої норми.

Патологічний лейкоцитоз буває при інфекційних захворюваннях (пневмонії, менінгіту, загальному сепсисі та ін.), інфекційних захворюваннях з ураженням клітин імунної системи, різних запальних захворюваннях, викликаних мікроорганізмами (фурункульозі, перитоніті і т.д.). Але є й винятки. Наприклад, деякі інфекційні захворювання протікають з лейкопенією (черевний тиф, бруцельоз, малярія, краснуха, кір, грип, вірусний гепатит у гострій фазі). Відсутність лейкоцитозу в гострій фазі інфекційного захворювання є несприятливою ознакою, це свідчить про слабку опірності організму.

Лімфоцити

Норма: абсолютний вміст - $1,2-3,0 \times 10^9/\text{л}$, але частіше в клінічному аналізі крові вказується процентний вміст лімфоцитів. Цей показник становить 19-37%. Розрізняють також **лимфоцитоз** і **лимфопенію**. Лімфоцитоз виявляється при хронічній променевої хвороби, бронхіальній астмі, тиреотоксикозі, деяких інфекційних захворюваннях (кашлюку, туберкульозі), при видаленні селезінки. До лимфопенії призводять іонізуюче випромінювання, аутоімунні захворювання, ендокринні захворювання, прийом гормональних препаратів, СНІД.

Т-лімфоцити

Норма: відносний вміст 50-90%, абсолютна кількість - $0,8-2,5 \times 10^9/\text{л}$. Кількість Т-лімфоцитів підвищується при алергічних захворюваннях, в період одужання, при туберкульозі. Зниження вмісту Т-лімфоцитів відбувається при хронічних інфекціях, імунодефіцитах, пухлинах, стресах, травмах, опіках, деяких формах алергії, інфаркті.

Т-хелпери

Норма: відносний вміст - 30-50%, абсолютне значення - $0,6-1,6 \times 10^9/\text{л}$. Вміст Т-хелперів підвищується при інфекціях, алергічних захворюваннях, аутоімунних захворюваннях (ревматоїдному артриті та ін.). Зниження вмісту Т-хелперів відбувається при імунодефіцитних станах, СНІД, цито-мегаловірусної інфекції.

В-лімфоцити

Норма: відносний вміст - 10-30%, абсолютне значення - $0,1-0,9 \times 10^9/\text{л}$. Підвищений вміст буває при інфекціях, аутоімунних захворюваннях, алергіях, лімфолейкозі.

Зниження кількості В-лімфоцитів виявляється при імунodefіцитах, пухлинах.

Фагоцити (нейтрофіли)

Фагоцитарна активність лейкоцитів підвищується при гострих бактеріальних інфекціях, знижується при вроджених імунodefіцитах, хронічних інфекціях, аутоімунних захворюваннях, алергіях, вірусних інфекціях, СНІДі. Активність роботи фагоцитів, тобто клітин-«пожирачів», оцінюється так званим фагоцитарним числом (в нормі клітина поглинає 5-10 мікробних часток), фагоцитарною ємністю крові, кількістю активних фагоцитів, індексом завершеності фагоцитозу (повинен бути більше 1,0).

При дослідженні імунного статусу визначають також рівень різних імуноглобулінів і кількість імунних комплексів (ІК). Імунний комплекс складається з антигену, антитіла і пов'язаних з ними компонентами.

3. Імунodefіцити

Імунна система, як і будь-яка інша система організму, може мати розлади в будь-яких ланках, що може призвести до виникнення так званого імунodefіциту. Основою імунodefіцитних станів є порушення генетичного коду, які не дозволяють імунній системі включати ту чи іншу ланку імунної відповіді. Імунodefіцитні стани можуть бути первинними (вродженими) і вторинними (набутими). У свою чергу первинні є вродженими, а вторинні - набутими.

3.1. Вроджені імунodefіцити.

Ця патологія є генетично обумовленою. Найчастіше вроджені імунodefіцити проявляються в перші місяці життя. Діти дуже часто хворіють на інфекційні захворювання, які нерідко протікають з ускладненнями. Існує робоча класифікація вроджених станів імунної недостатності, запропонована експертами ВООЗ в 1971 р Відповідно до цієї класифікації первинні імунodefіцити розподіляються на п'ять великих груп.

1. До першої групи належать захворювання, які пов'язані тільки з дефектом В-клітин, наприклад імунна недостатність, сцеплена з Х-хромосомою.

2. До другої групи належать захворювання імунної недостатності з дефектом тільки Т-клітин, наприклад, гіпоплазія зобної залози (синдром Ді Джорджі).

3. Третя група - це захворювання з одночасним ураженням В- і Т-клітин: тімома (пухлина тимуса) і ін.

4. У четверту групу входять такі стани імунodefіциту, при яких одночасно вражені В- і Т-стовбурові клітини, наприклад, комбінована імунна недостатність, що пов'язана зі зчепленням з Х-хромосомою, і ін.

5. У заключну п'яту групу включені некваліфіковані вище стани імунної недостатності.

На практиці вроджені стани імунної недостатності обмежуються трьома основними групами:

1) дефектами фагоцитозу;

2) недостатністю клітинного і гуморального імунітету (Т-, В- і стовбурових клітин);

3) порушенням функцій комплементарної системи.

Клінічні прояви вроджених імунодефіцитних станів дуже різноманітні. Вони варіюють від важких симптомів, викликаних перенесеними інфекціями або вакцинацією, до середніх і легких і хворобливих станів, що важко діагностуються. Вроджені або первинні імунодефіцити є одними з найчастіших причин ранньої дитячої смертності.

3.2. Придбані імунодефіцити. Їх ще називають вторинними імунодефіцитами, так як вони з'являються в процесі життя людини з найрізноманітніших причин. Іншими словами, вони виникають як результати впливу безлічі факторів на організм, який при народженні мав здорову імунну систему. Цими уражаючими факторами можуть бути:

- 1) несприятлива екологія (забруднення води, повітря і т. і.);
- 2) порушення харчування (нераціональні дієти, що викликають порушення обміну речовин, голодування);
- 3) хронічні захворювання;
- 4) тривалий стрес;
- 5) не повністю вилікувані гострі бактеріальні та вірусні інфекції;
- 6) захворювання печінки і нирок (органів, що забезпечують детоксикацію організму);
- 7) радіація;
- 8) неправильно підібрані лікарські засоби.

Науково-технічний прогрес сприяв до використання нашої цивілізацією величезної кількості штучних (синтетичних) добавок до харчування, ліків, засобів гігієни тощо. Якщо ці фактори довгостроково впливають на організм, то в крові і лімфі накопичуються отруйні сполуки і продукти обміну речовин в такій концентрації, що можуть розвинути хронічні захворювання. В результаті цього деякі види бактерій, які були поглинені макрофагами (фагоцитами), не гинуть, а починають активно розмножуватися, це призводить до загибелі фагоцитів. У нормальних умовах повинні гинути мікроорганізми. Проблема вторинних імунодефіцитів є дуже актуальною для сучасності. Вони можуть серйозно змінювати і обтяжувати хвороби, впливати на їх перебіг і ефективність лікування.

Існують тимчасові порушення імунітету, так звані функціональні порушення. Вони добре піддаються корекції (найчастіше у дітей). Тимчасове зниження активності імунних показників може бути і у здорових людей. Зазвичай це пов'язано з сезонними явищами (зниженням сонячної активності, вологою погодою), що призводить до епідемічних спалахів простудних захворювань, грипу. При своєчасному втручання функціональні зміни імунітету легко відновлюються до норми. Якщо вторинні імунодефіцити порушують процеси самоочищення організму, то з часом цей дисбаланс може призвести до аутоімунних захворювань та онкології.

3.3. Аутоімунні захворювання.

Ці захворювання можуть виникнути під впливом несприятливих факторів навколишнього середовища. В основі патогенезу аутоімунних патологій лежить порушення роботи Т-лімфоцитів (супресорів). В результаті імунна система починає проявляти агресію проти власних (здорових) клітин. Відбувається «самоушкодження» тканин або органів.

Аутоімунні захворювання мають спадкову схильність. До цих захворювань відносяться ревматоїдний артрит, ревматизм, розсіяний склероз і т.і. У всіх аутоімунних захворювань є розвиток за принципом порочного кола. Схематично це коло можна описати таким чином. Коли чужорідні агенти (бактерії, віруси, грибок) проникають до клітини, то розвивається запальна реакція, що має своєю метою ізолювати, відторгнути шкідливий агент. При цьому власна тканина змінюється, відмирає і сама стає для організму чужорідною, і вже на неї починають вироблятися антитіла, в результаті чого знову розвивається запалення. Коли воно досягає стадії некрозу, то

некротична тканина теж стає антигеном, шкідливим агентом, на який знову виробляються антитіла, в результаті чого знову виникає запалення. Антитіла і запалення руйнують цю тканину. І так відбувається нескінченно, утворюється болюче і руйнівне коло. Первинного агента (бактерії, вірусу, грибка) вже немає, а хвороба продовжує руйнувати організм.

3.4. СНІД.

СНІД - це синдром набутого імунодефіциту, який викликається вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), тому захворювання має двояку назву: СНІД або ВІЛ-інфекція. Вірус імунодефіциту людини був виділений в 1983 р. французькими, а потім і американськими дослідниками. Виявлення вірусу в тих чи інших субстратах, пов'язаних з хворими (крові, слині, спермі), дало можливість уточнити шляхи передачі захворювання.

СНІД – хвороба протікає важко, при захворюванні, що далеко зайшло загибель хворого практично неминуча. За рівнем смертності СНІД вийшов на третє місце після атеросклерозу і раку. Правда, це стосується таких форм захворювання, що мають виражену клінічну картину. Незважаючи на те що СНІД не можна назвати широко поширеним захворюванням, збільшення числа хворих, на думку вчених, зростає в геометричній прогресії. Вважається, що число хворих подвоюється кожні півроку. Викликає тривогу і той факт, що згідно з останніми даними контингент, який має антитіла до вірусу - збудника СНІДу, обчислюється мільйонами. Все це викликає побоювання, що в майбутньому набутий імунодефіцит може стати масовим захворюванням. Відзначається і широке географічне поширення СНІДу. В даний час немає жодного населеного континенту, вільного від цього захворювання.

Вірус імунодефіциту людини належить до так званих **ретровірусів**. Ретровіруси - єдині в світі живі істоти, здатні синтезувати ДНК з РНК, в той час як інші можуть синтезувати тільки РНК з ДНК. Для забезпечення такого процесу у вірусів цієї групи є фермент зворотна транскриптаза. Звідси і назва ретровірусу (від лат. «ретро» - «зворотний»). Серед вірусів тварин, що викликають імунодефіцитні стани, найбільший інтерес представляють ретровіруси мавп. Потрапивши в організм людини, вірус імунодефіциту людини прикріплюється до особливих утворень, розташованих на клітці-лімфоциті, потім проникає всередину неї, вбудовується в генетичний апарат клітини і змушує продукувати частинки вірусу до тих пір, поки клітина не загине. Нові віруси вражають нові клітини і т.д. Перш ніж кількість лімфоцитів знизиться до такої межі, що розвинеться імунодефіцит, може пройти десяток років. Але весь цей час заражена людина, відчуваючи себе здоровою, для інших може бути джерелом інфекції.

Ця інфекція має ряд клініко-епідеміологічних особливостей. До них відносяться:

- 1) надзвичайно (для величезної більшості інфекцій) тривалий інкубаційний період (іноді перевищує 5 років), тому СНІД можна віднести до так званих повільних вірусних інфекцій;
- 2) виключно «вузьке» коло діяльності вірусу - він вражає лише деякі категорії імунокомпетентних клітин, але це не заважає виникненню тотального ураження всієї захисної системи організму;
- 3) інфекція не має певної клінічної картини, що робить неможливою лише клінічну діагностику захворювання.

Численні особливості захворювань в теперешній час не піддаються раціональному поясненню. Залишається незрозумілим походження СНІДу. Однак вже досить вивченим є механізм дії вірусу СНІДу на організм і описані клінічні прояви захворювання в розгорнутій стадії. **Основною в патогенезі ВІЛ-інфекції є виявлена здатність вірусу вибірково вимикати Т-хелпери, в результаті чого імунна відповідь не розвивається**, а людина стає абсолютно беззахисною перед будь-якою інфекцією або патологією (може померти навіть від умовно-патогенних бактерій). Вірус, потрапляючи в Т-хелпери, може багато років знаходитися в

неактивному стані, але людина вже є інфікованою. Коли ж ВІЛ з якихось причин активізується, розвивається СНІД, більшість хворих помирають протягом 1-2 років.

У хворих на СНІД відсутній синтез інтерлейкіну-2.

Що стосується шляхів передачі інфекції, то не підлягає сумніву, що СНІД передається прямим контактом при статевих контактах. Іншим шляхом передачі інфекції вважається контактнобитовий шлях - через предмети, що заражені кров'ю джерела інфекції, а також при попаданні вірусу в організм через дрібні дефекти на шкірі і слизових оболонках. Безсумнівна можливість «вертикальної» передачі інфекції від матерів-вірусоносіїв або хворих.

До головної особливості цієї інфекції відноситься тривалість інкубаційного періоду. Поза всяким сумнівом, СНІД є інфекцією з дуже тривалою інкубацією (від декількох місяців до декількох років). Причому тривалість інкубації для різних вікових груп неоднакова. Наприклад, при переливанні крові інкубація може розтягуватися до 58 місяців. Середня тривалість інкубаційного періоду у дітей - 12 місяців, у дорослих - 29 місяців.

Ранніми ознаками СНІДу є посилення симптоматики попереднього періоду - періоду преСПІДу:

- 1) лихоманка нез'ясованої етіології з перебігом, що не піддається звичайному лікуванню;
- 2) лімфаденопатія - збільшення розмірів лімфовузлів;
- 3) наростаюча загальна слабкість і втрата апетиту;
- 4) діарея і зниження маси тіла;
- 5) збільшення печінки і селезінки;
- 6) кашлюк;
- 7) лейкопенія.

ЛЕКЦІЇ 11-12

АЛЕРГІЧНІ ЗАХВОРЮВАННЯ

1. Поняття про алергію, механізм розвитку алергічних реакцій, причини збільшення алергічних реакцій
2. Загальна етіологія алергічних захворювань. Класифікація алергенів і їх характеристика.
 - 2.1. Побутові алергени.
 - 2.2. Інсектні алергени.
 - 2.3. Епідермальні алергени.
 - 2.4. Лікарські алергени.
 - 2.5. Пилкові алергени.
 - 2.6. Харчові алергени.
 - 2.7. Промислові алергени.
 - 2.8. Алергени інфекційного походження.
3. Патогенез алергічних процесів. Класифікація алергічних реакцій.
4. Анафілактичний шок.

1. Поняття про алергію, механізм розвитку алергічних реакцій, причини збільшення алергічних реакцій.

Урбанізація, хімізація, зміна харчових раціонів, збільшення частини консервованих і рафінованих продуктів, застосування сильнодіючих лікарських препаратів тощо, викликали вплив на організм людини таких чинників, з якими захисні механізми раніше не взаємодіяли. Сформувався вираз «хвороби цивілізації», який позначає кількісне зростання таких захворювань, як серцево-судинні патології, рак, різні алергії і т. і. З'явилися раніше невідомі захворювання, такі як «хвороба легіонерів» (гостре запалення легенів), СНІД тощо. Всі ці факти свідчать про те, що системи захисту людського організму розвиваються, відповідаючи на зміну умов існування, формуванням нових елементів компенсаторною захисту. Ці факти підтверджуються широким розвитком алергічних реакцій, які набувають масових масштабів.

Алергії відомі ще з давніх часів. Ще Гіппократ описував бронхіальну астму. В теперешній час в медицині алергологія виділена в окрему науку, яка намагається розкрити причини виникнення алергій і розробляє нові методи як їх лікування, так і попередження.

За останні два десятиліття частота алергічних захворювань істотно зросла, особливо в економічно розвинених країнах і в країнах з неблагополучною екологічною ситуацією. За прогнозами деяких вчених, XXI століття стане століттям алергічних захворювань. В даний час вже відомо понад 20 тисяч алергенів, і їх кількість продовжує зростати.

Що ж таке алергія? У чому принципова особливість її фундаментальних механізмів і клінічних проявів?

Термін «алергія» позначає підвищену чутливість організму до дії тих чи інших речовин зовнішнього і внутрішнього середовища при повторному з ним контакті.

Вперше термін "алергія" був запропонований в 1906 р. австрійським педіатром К. Пірке для визначення змін реактивності, яку він спостерігав у дітей при сировоточній хвороби і інфекційних захворюваннях. Для цього загального поняття зміненої реактивності він запропонував вираз "алергія" (від грец. alio- інший; ergon- дію).

Речовини, здатні викликати цю підвищену чутливість, називаються алергенами. Алергени, як і антигени, викликають утворення в організмі антитіл. Але на відміну від антигенів, що мають біологічну природу, алергенами можуть бути різноманітні речовини, які містяться в харчових продуктах, хімічних речовинах, косметичних засобах, ліках, лікувальних сироватках, домашньому пилю і т. п. Для багатьох людей це абсолютно нешкідливі речовини, але для людини, яка схильна до алергії, вони стають причинами бронхіальної астми, сінної лихоманки, кропив'янки, алергічної нежиті, а, іноді, важкого анафілактичного шоку. Особливістю алергічної реакції є те, що перша взаємодія алергену з організмом ніяк не проявляється зовні. На нього імунна система реагує тим, що утворюються антитіла до конкретного алергену, наприклад антитіла класу Е (або реакіни). Таким чином, перша взаємодія з алергеном робить організм чутливим до нього. При повторному контакті з алергеном відповідний йому клон реактивів вмикає алергічну реакцію негайного (через 1-2-е доби) типу. Для алергічних реакцій характерно те, що:

- алерген і антитіло з'єднуються на цитоплазматичній мембрані клітини-мішені;
- в результаті впливу комплексу алерген-антитіло на певні клітини (тучні клітини) виділяються хімічно активні речовини (гістамін, серотонін та ін.), які ініціюють алергічну реакцію;
- хімічно активні речовини, які утворилися в другій стадії, впливають на організм, викликаючи пошкодження клітин, тканин і запалення.

Таким чином, на відміну від чисто імунної реакції, в якій клітини організму руйнуються антигеном, а Т-і В-лімфоцити знищують антигени, при алергічній реакції патологічне руйнування клітин відбувається під впливом речовин, що виробляються самим організмом. Тому вважається, що реакція підвищеної чутливості, алергія, не є частиною захисного механізму, а, навпаки, пошкодження тканини при алергії є несприятливим фактором та навіть «прорахунком» імунного процесу.

Сьогодні виділяють три стадії істинної алергічної реакції.

Імунна стадія - триває від моменту первинного контакту імунної системи з алергеном до розвитку сенсibilізації.

Сенсibilізація - це підвищення чутливості організму до антигенів (алергенів) екзогенного або ендogenousного походження. Поняття сенсibilізації та алергії розрізняються між собою. Алергія включає в себе не тільки підвищення чутливості до будь-якого антигену, а й реалізацію цієї підвищеної чутливості у вигляді алергічної реакції. Спочатку підвищується чутливість до антигену, і тільки тоді, якщо алерген (антиген) залишається в організмі або потрапляє в нього знову, розвивається алергічна реакція, тобто сама алергічна реакція має дві складові частини. Ці частини розділені в часі. При цьому сенсibilізація є першою (або підготовчою) частиною, а друга частина є власне алергічною реакцією.

За способом отримання розрізняють **активну** і **пасивну сенсibilізацію**. Активна сенсibilізація розвивається при штучному введенні або природному попаданні алергену в організм. Пасивна сенсibilізація відтворюється в експерименті при введенні сироватки крові або лімфоїдних клітин пасивного реципієнта від активно сенсibilізованого донора. Якщо виникає сенсibilізація плода під час його внутрішньоутробного розвитку, то таку сенсibilізацію називають внутрішньоутробною. Сенсibilізація може бути моновалентною, коли є підвищена чутливість до одного алергену, і полівалентною при сенсibilізації до багатьох алергенів. Існує і так звана

перехресна сенсibilізація, коли є підвищення чутливості сенсibilізованого організму до інших антигенів, які мають загальні детермінанти з тим алергеном, який викликав сенсibilізацію.

- **Патохімічна стадія** - вмикається при повторному контакті імунної системи зі специфічним алергеном і характеризується вивільненням великої кількості біологічно активних речовин.
- **Патофізіологічна стадія** - характеризується порушенням функціонування клітин та тканин організму аж до їх пошкодження під впливом біологічно активних речовин, виділених імунною системою під час патохімічної стадії.

В організм постійно надходять ззовні речовини антигенної природи: через шкіру, дихальну систему, шлунково-кишковий тракт. У самому організмі в процесі метаболізму утворюються речовини антигенної природи, які знищуються механізмами гуморального і клітинного (неспецифічного) та імунного (специфічного) захисту. Чужорідні клітини і антигени, що постійно утворюються або надходять в організм ззовні, самі по собі не викликають пошкоджень, або не встигають їх викликати, оскільки механізми захисту обмежують їх кількість мінімальним рівнем, який не перевищує певного порогу. Перевищення цього порогу вмикає патологічну реакцію.

Таким чином, для розвитку патологічних реакцій мають значення не наявність руйнувань, а їх масштаби і сила. В одних випадках імунний механізм забезпечує захист організму, а в інших – його руйнування. Один і той же антиген у різних людей може викликати або імунну, або алергічну реакцію. Однак велика кількість антигенів викликають *переважно* алергію, наприклад пилок рослин, харчові продукти, лупа, шерсть тварин, кімнатний пил і т. д. При попаданні в організм через *шкіру і слизові* вони викликають утворення імуноглобуліну Е і, внаслідок, цього алергію. Але введення їх через стравохід, навіть у великих кількостях, призводить до утворення імунних антитіл, які, з'єднуючись з алергеном, не викликають пошкодження тканин.

Таким чином, антиген може проявляти і не проявляти алергенних властивостей, це залежить від кількості та шляхів проникнення. Для реалізації механізму відповідної реакції велике значення має також *реактивність організму*, тобто його здатність в якісному і кількісному відношенні реагувати на антигенне роздратування. Від реактивності організму багато в чому залежить здатність організму формувати імунітет або, при неспроможності імунітету, формувати алергічну реакцію - патологічний процес, що має риси захисту і руйнування. При алергічній реактивності ймовірніше, що антиген буде проявляти алергічні властивості, тобто при повторному його введенні виникне реакція, яка може призвести до пошкодження тканини. Умовами, які сприяють переводу імунної реакції в алергічну, є підвищення проникності покривних тканин, це сприяє надходженню антигенів в організм, зміна характеру імунної відповіді, порушення співвідношення різних класів імуноглобулінів та їх кількості, збільшення утворення медіаторів алергічних реакцій і зменшення їх інактивації.

Збільшення числа алергічних захворювань обумовлено декількома причинами.

- Зміна структури інфекційної захворюваності. По-перше, зниження рівня або навіть повна ліквідація епідемічних захворювань зменшило контакт людини з сильними алергенами їх збудників, які гальмували реакцію на переважно слабкі алергени навколишнього середовища. Як це не парадоксально звучить, але сьогодні є всі підстави говорити, що поліпшення якості життя, зниження числа вірусних і бактеріальних захворювань в дитинстві, в тому числі, туберкульозу, призводить до посилення функції Т-хелперів і розвитку алергічних реакцій в майбутньому.
- По-друге, введення вакцин, сироваток та інших речовин антигенної природи викликає підвищену чутливість (сенсibilізацію) схильних до цього організмів.

- По-третє, різко зросла кількість нових хімічних речовин, які навіть не зустрічаються в природі. До цих речовин відносяться лікарські препарати, безконтрольний прийом яких викликає зміну реактивності організму, діє на нейроендокринну систему.
- По-четверте, зміна умов та способу життя і харчування. Порушення контакту з природою, міські умови життя призводять до того, що природні продукти (пилки рослин, лупа, шерсть тварин і т. п.), з якими людина раніше зустрічалася з моменту народження, стають чужорідними, а безконтрольна хімізація сільського господарства призводить до підвищення вмісту в продуктах харчування хімічних речовин. Кожен клас імуноглобулінів призначений для захисту організму від певних груп антигенів, тому можна припустити, що імунна система формує новий елемент захисту - імуноглобуліни класу E, або реагенти для боротьби з незвичайними антигенами-алергенами, так як імуноглобуліни інших класів не викликають універсальну захисну реакцію з цими антигенами – запалення. Тобто, імунна система проходить еволюцію, пристосовуючись до нових умов середовища. Результатом адаптації є підвищена реактивність окремих людей, викликана індивідуальними особливостями їх імунної системи.

2. Загальна етіологія алергічних захворювань. Класифікація алергенів і їх характеристика.

Таким чином, причинами алергічних захворювань є алергени. Умови виникнення алергії - певні особливості зовнішнього середовища і стан реактивності організму. Незважаючи на безліч оточуючих людину алергенів, захворюють не всі, а певний відсоток людей, так як в розвитку алергічних хвороб значна роль належить тим конкретним несприятливим умовам, які складаються в даний момент і сприяють реалізації дії алергену на організм.

Алерген - це речовина, що викликає розвиток алергічної реакції. Чим відрізняється алерген від антигену? Головною відмінністю є кінцевий результат дії. Якщо речовина викликає алергічну реакцію, то вона називається алергеном, якщо веде до розвитку імунної реакції - антигеном. Виходить, що алергени мають всі властивості антигенів (це переважно білкова природа, макромолекулярна, чужорідна для даного організму і ін.).

Але алергічні реакції можуть викликати не тільки речовини антигенної природи, а й речовини, які володіють цими властивостями. До них відносяться багато мікромолекулярних з'єднань, наприклад лікарські препарати, прості хімічні речовини (бром, йод, хром, нікель і ін.), а також більш складні сполуки небілкової природи (деякі мікробні продукти, полісахариди та ін.). Ці речовини називають **гаптенами**. При попаданні в організм вони не включають імунні механізми, а стають антигенами (алергенами) тільки після з'єднання з білками тканин організму. При цьому утворюються так звані комплексні антигени, які й сенсibiliзують організм.

Специфічність комплексного антигена визначається специфічністю гаптена. При цьому зміни властивостей білка-носія можуть бути різними. В одних випадках його просторова конфігурація не змінюється або змінюється незначно. Вона не стає для організму чужорідною, тому сенсibiliзація йде тільки до гаптену. В інших випадках приєднання гаптена викликає значні зміни конформації носія. Відбувається денатурація білкових молекул. Це спостерігається при приєднанні галогену, нітруванню, ацетилюванні, приєднанню хрому та ін. В цих випадках розвивається сенсibiliзація не тільки до гаптенів, але й до змінених ділянок білкової молекули.

Таким чином, узагальнюючи вище сказане, слід зробити висновок: якщо конформація носія не змінюється, то розвиваються алергічні реакції, які відбуваються на кшталт реакцій на екзогенний (зовнішній) алерген, тобто з розвитком алергічних захворювань, при зміні конформації носія, приєднуються аутоалергічні реакції.

Однак не кожне з'єднання хімічної речовини з білком призводить до утворення антигену. Багато лікарських препаратів в організмі з'єднуються з сироватковими білками, але такі комплекси не завжди стають для організму антигенами. Сироваткові білки з'єднуються і

з багатьма мікромолекулярними сполуками, що утворюються ендогенно (наприклад, стероїдними гормонами, іонами міді, заліза, продуктами метаболізму) та виконують по відношенню до них транспортну функцію. Але це також не веде до появи антигенів. З'єднання транспортних білків з відповідним ендогенним продуктом або метаболітом може змінювати конформацію носія, але не призводить до його денатурації, так як ці структурні зміни, вироблені в процесі еволюції, для організму є «своїми», до них є імунологічна толерантність, тобто вони не сприймаються як чужерідні.

Інша справа, коли в організм надходять хімічні сполуки ззовні, які не є продуктами природного обміну речовин і потрапляють іноді не через шлунково-кишковий тракт, а через шкіру або дихальні шляхи. Всі ці речовини в організмі зазвичай піддаються метаболізму (найчастіше в печінці) і виводяться. Але якщо серед цих речовин або їх метаболітів зустрічаються такі, які мають активну, реакційну ділянку в структурі молекули, то такі речовини з'єднуються з білком-носієм хімічними зв'язками. Це веде до утворення комплексного алергену.

Існує класифікація, в основі якої лежить спосіб потрапляння алергену в організм:

- 1) повітряні, інгаляційні алергени (побутові виробничі пил, пилок рослин, епідерміс і шерсть тварин та ін.);
- 2) харчові алергени;
- 3) контактні алергени, проникаючі через шкіру і слизові оболонки (хімічні речовини, ліки);
- 4) ін'єкційні алергени (ліки, сироватки);
- 5) інфекційні алергени (бактерії, віруси);
- 6) лікарські алергени.

В кожену групу цієї класифікації входять алергени різного походження. Існує і більш зручна класифікація, яка заснована на походженні екзогенних алергенів. Вони поділяються на такі групи:

- 1) алергени неінфекційного походження - побутові, епідермальні, пилкові, харчові, промислові;
- 2) алергени інфекційного походження - бактерійні, грибові, вірусні.

2.1. Побутові алергени.

Головну роль серед них відіграє домашній пил. Це складний за своїм складом алерген, в який входять пилові частинки (з одягу, постільної білизни, матраців), гриби (в сирих приміщеннях), частинки домашніх комах, бактерії (непатогенні стафілококи і ін.). Головними алергенами в домашньому пилу є кліщі та продукти їх життєдіяльності. Вони мешкають в ліжках, подушках, де харчуються частинками епідермісу людини. При перетрушуванні ліжку кліщі, їх частинки і екскременти потрапляють в дихальні шляхи. Цей вид кліщів є дуже поширеним. Велику алергенність мають дафнії, що входять до корму акваріумних рибок. Побутові алергени викликають найчастіше алергічні захворювання органів дихання.

2.3. Інсектні алергени.

Це алергени отрути комах, що жалять, слини таких, що кусають і частинок покриву тіла комах. Ці алергени викликають як місцеві, так і загальні алергічні реакції. У людей з підвищеною чутливістю до однієї комах є така ж підвищена чутливість і до інших комах в межах ряду та родини, так як у них є спільні антигени.

2.4. Епідермальні алергени.

До цієї групи належать лупа, шерсть тварин, пір'я птахів, луска риб. Одним з особливих алергенів є лупа конів. Цей вид алергенів викликає професійну алергію у працівників віваріїв, вівчарів, працівників птахоферм, конярів, перукарів. Проявляється ринітом, бронхіальною астмою, кропив'янкою.

Практично будь-який лікарський препарат може привести до розвитку лікарської алергії. Ліки або їх метаболіти є, як правило, гаптенами і стають повноцінними алергенами тільки після зв'язування з білками тканин. Молекула ліків має ділянку, в якій йде утворення антитіл, тобто ця ділянка (а не вся молекула цілком) виконує роль антигенної детермінанти. Такі ділянки можуть виявитися однаковими у різних лікарських препаратів, тому при сенсibiliзації до одного препарату будуть виникати алергічні реакції і на всі інші ліки, що мають ту ж детермінанту.

Таким чином, необхідно при алергії на один препарат виключити застосування всіх препаратів, які мають спільну з ним детермінанту.

2.5. Пилцеві алергени.

Алергічні захворювання викликає пилок не всіх видів рослин, а тільки досить дрібний (діаметром не більше 35 мкм), а також той, що володіє хорошим летючим ефектом. Найчастіше це пилок різних видів вітрозапилюваних рослин. Алергія, викликана пилом рослин, називається поліноз. Антигенний склад пилку досить складний і складається з декількох компонентів. Наприклад, до складу пилку амброзії входять 5-10 антигенів, а пилок тимофіївки містить до 7-15 антигенних компонентів. Різні види пилку можуть мати загальні алергени, тому у людей, чутливих до одного виду пилку, можлива реакція і на інші її види. Знайдено загальні алергени в пилку злакових трав (тимофіївки, жита, костриці, тонконога). У кожній кліматогеографічній зоні є свої види рослин, пилок яких найчастіше викликає розвиток полінозу. У східних і південних областях України це пилок бур'яну амброзії і диких конопель, в містах - пилок лугових трав тощо.

2.6. Харчові алергени.

Алергенами можуть бути багато харчових продуктів. Але найчастіше ними є риба, м'ясо (особливо свинина), яйця, молоко, шоколад, пшониця, боби, томати. Крім того, алергенами можуть бути і харчові добавки, що входять до складу продуктів і що є хімічними речовинами. Це антиокислювачі, барвники, ароматичні та інші речовини.

2.7. Промислові алергени.

Бурхливий розвиток хімічної промисловості значно збільшив кількість різних хімічних речовин на виробництві та в побуті, отже, і контакт з ними людей. Це викликало появу різних за характером алергічних реакцій. Промислові алергени в переважній більшості є гаптенами, які з'єднуються з білками. Вважається, що чим вище здатність гаптена утворювати хімічний зв'язок з білком, тим вище його алергенна активність. Найбільш часті промислові алергени - це скипидар, масла, нікель, хром, миш'як, дьоготь, смоли, дубильні речовини, барвники тощо. У перукарнях і косметичних салонах алергенами можуть бути барвники для волосся, брів та вій, рідина для хімічної завивки і т. і. У побуті алергенами можуть бути мило, пральні засоби, синтетичні тканини і т. д.

2.8. Алергени інфекційного походження.

Алергічні процеси можуть викликати найрізноманітніші збудники інфекційних хвороб, а також продукти їх життєдіяльності. Ті інфекційні хвороби, в патогенезі яких алергія відіграє провідну роль, називаються інфекційно-алергічні захворювання. До них відносяться всі хронічні інфекції (туберкульоз, лепра, бруцельоз, сифіліс, ревматизм, хронічні кандидози та ін.). По мірі ліквідації епідемічних захворювань стали здобувати більш велике значення алергічні процеси, які викликаються умовно-патогенною і

сапрофітною флорою.

Дуже поширеними алергенами є гриби. Близько 350 видів грибів виявляють алергенну активність. Серед них є патогенні для людини види, які викликають захворювання з алергією в основі патогенезу. Такими захворюваннями є, наприклад, аспергільоз, актиномікоз, кокцидіоз, гістоплазмоз та ін. Однак багато не патогенних для людини грибів при потрапленні в організм викликають сенсibiliзацію і розвиток різних алергічних захворювань (бронхіальну астму та ін.). Такі гриби містяться в атмосферному повітрі, житлах, домашньому пилу, запліснявілих харчових продуктах і т. і. Їх концентрація залежить від пори року, вологості, температури та інших умов.

3. Патогенез алергічних процесів. Класифікація алергічних реакцій.

Існують різні класифікації алергічних реакцій. Найбільш поширена ділить всі алергічні реакції на **алергічні реакції негайного типу** і **алергічні реакції сповільненого типу**. В основу цієї класифікації встановлений час появи реакції після контакту з алергеном. Реакція негайного типу розвивається протягом 15-20 хв, уповільненої типу - через 1-2 доби. Але ця класифікація не охоплює всієї різноманітності проявів алергії. Наприклад, деякі реакції розвиваються через 4-6 або 12-18 годин, тобто їх не можна віднести ні до реакцій сповільненого, ні до реакцій негайного типів. Тому відмінності між алергічними реакціями стали пов'язувати з різними механізмами їх розвитку і склали класифікацію, засновану на патогенетичному принципі. Всі алергічні реакції ділять на *справжні*, або власне алергічні, і *несправжні*, або *псевдоалергічні* (неиммунологические). У свою чергу справжні, або власне алергічні, діляться на *хімергічні* (В-залежні) і *китергічні* (Т-залежні).

Справжні, власне алергічні, реакції мають імунологічну стадію в своєму розвитку, несправжні її не мають. Розподіл справжніх реакцій на два види заснован на характері імунологічного механізму. Хімергічні викликаються реакцією алергену з антитілами (від грец. Himos - «сік»), а китергіческие викликаються з'єднанням алергену з сенсibiliзованими лімфоцитами (від грец. Citos - «клітка»).

Далі ця класифікація була вдосконалена. У ній були деталізовані імунологічні механізми. Хімергічні реакції стали називатися В-залежними, так як саме з В-лімфоцитами пов'язано утворення антитіл. Залежно від класу імуноглобулінів, до яких належать антитіла, що утворилися, в В-залежних алергічних реакціях виділені А, J, Е і М-глобулінові реакції. Китергіческие реакції отримали назву Т-залежних.

Існує ще одна широко поширена класифікація, яка також заснована на патогенетичному принципі. В її основу покладено особливості імунних механізмів. Відповідно до цієї класифікації виділені 4 типи алергічних реакцій:

- 1) анафілактична (IgE- і рідше IgG-антитіла);
- 2) цитотоксична (IgG- і IgM-антитіла);
- 3) тип Артюса - пошкодження імунним комплексом (IgG- і IgM-антитіла);
- 4) уповільнена гіперчутливість (сенсibiliзованілімфоцити).

Розрізняють 4 типи реакцій гіперчутливості при алергічних реакціях (мал. 19):

1) **реагиновий тип пошкодження тканин**. Назва цього типу походить від назви антитіл-реагнів, які беруть участь в його розвитку. Реагини відносяться головним чином до IgE-класу, але серед них є і реагини IgG-класу. Його ще називають атонічний (від грец. Atonos - «незвичайний», «чужий»), анафілактичний, алергічна реакція негайного типу. У відповідь на потраплення в організм


алергену утворюються реагини. Вони фіксуються головним чином на огрядних клітках і їх аналогах в крові - базофилах. В результаті виникає стан сенсibiliзації. Повторне попадання в організм одного і того ж алергену приводить до з'єднання його з реагинами, що утворилися. Це викликає викид із стовбурових клітин і базофілів цілого ряду біологічно активних речовин, а також їх утворення іншими клітинами. Медіатори, що утворилися і звільнилися здійснюють як захисний, так і патогенний ефекти. Медіаторами реакцій реагінного типу є гістамін, серотонін, простагландини.

2) цитотоксичний тип пошкодження тканин. Цитотоксичним його називають тому, що створені антитіла до антигенів клітин з'єднуються з клітинами і викликають їх пошкодження і навіть лізис (цитологічну дію). Пошкодження може йти трьома шляхами:

- а) за рахунок активації комплементу утворюються активні фрагменти комплементу, які ушкоджують клітинну мембрану;
- б) за рахунок активації фагоцитозу клітин, покритих антитілами.
- в) за рахунок активації лізосомальних ферментів, які виділяються фагоцитами.

3) пошкодження імунними комплексами. При цьому типі алергічних реакцій пошкодження викликається імунними комплексами. Уявлення про ці типи сформувалися на основі спостережень за місцевою токсичною дією на тканині комплексу антиген-антитіло, утвореного в надлишку антигена. На антиген, що потрапляє в організм і який має розчинну форму, йде утворення антитіл. Найбільшу роль в цьому випадку грають антитіла IgG- і IgM-класів. При певних умовах комплекс антиген-антитіло може викликати пошкодження і розвиток захворювання. У цих випадках шкідлива дія комплексу реалізується головним чином через активацію комплементу, звільнення лізосомальних ферментів, утворення медіаторів (кінінів, серотоніну, гістаміну).

4) алергічна реакція уповільненого типу. Цим терміном позначають групу алергічних реакцій, які розвиваються у сенсibiliзованих людей через 24-48 год. після контакту з алергеном. Спочатку характерною ознакою було час розвитку реакції. Потім було встановлено, що в механізмі їх виникнення основна роль належить дії сенсibiliзованих лімфоцитів на алерген. Гіперчутливість IV типу пов'язана з тим, що сенсibiliзовані антигеном Т-клітини при повторній зустрічі з тим же антигеном виділяють цитокіни, які викликають запальні реакції, а також активують макрофаги, які виділяють медіатори запалення.



Мал. 19. Типи реакцій гіперчутливості

1. Тип I характеризується зв'язуванням IgE з рецепторами тучних клітин. При контакті з алергеном відбувається перехресне зв'язування IgE, що викликає вивільнення медіаторів алергічних реакцій.

2. При гіперчутливості II типу виробляються антитіла до антигену поверхні власних клітин організму або чужорідного антигену (наприклад, еритроцитів при переливанні крові). Зв'язування таких антитіл на клітинах-мішенях може викликати цитотоксичний ефект або лізис клітин.

3. Гіперчутливість III типу обумовлена відкладенням в тканинах імунних комплексів. При цьому відбувається активація комплементу і в місці відкладення комплексів відбувається локальне пошкодження тканин і запалення.

4. Гіперчутливість IV типу пов'язана з тим, що сенсibilізовані антигеном Т-клітини при повторній зустрічі з тим же антигеном виділяють цитокіни, які викликають запальні реакції, а також активують макрофаги, які виділяють медіатори запалення.

У відповідь на потрапляння в організм алергену утворюються так звані сенсibilізовані лімфоцити. Вони відносяться до Т-популяції лімфоцитів, і в їх клітинну мембрану вбудовані також структури, які відіграють роль антитіл, здатних з'єднуватися з відповідним антигеном. При повторному попаданні алергену він з'єднується з сенсibilізованими лімфоцитами. Це веде до ряду морфологічних біохімічних і функціональних змін в лімфоцитах. Вони проявляються у вигляді посилення синтезу ДНК, РНК і білків, секретій різних медіаторів, які називаються лімфокінами. За допомогою лімфокінів відбувається мобілізація різних клітин. Під впливом одних лімфокінів несенсibilізовані лімфоцити набувають підвищену чутливість до алергену. Особливий вид лімфокінів надає цитотоксичну і гнітючу активність клітин дію. Сенсibilізовані лімфоцити надають і пряму дію на клітини-мішені (цитотоксичну дію). Відзначається руйнування клітин-мішеней, їх фагоцитоз, підвищення проникності судин. Все це проявляється у вигляді запальної реакції. Основними медіаторами четвертого типу алергічних реакцій є лімфокіни, утворені в процесі взаємодії Т- і В-лімфоцитів з алергенами. Лімфокіни діють на різні клітини (макрофаги, лімфоцити, фібробласти, епітеліальні клітини та ін.) через відповідні рецептори на цих клітинах.

Розглянувши типи алергічних реакцій, потрібно зробити наступний висновок. Включення того чи іншого типу алергічної реакції визначається багатьма факторами, але їх можна звести до двох основних. Це властивості антигену і реактивність організму. Серед властивостей антигену важливу роль відіграють його хімічна природа, фізичний стан і кількість. Слабкі антигени, які знаходяться в навколишньому середовищі в невеликих кількостях (пилки рослин, домашній пил, лупа і шерсть тварин), частіше дають атонічний тип алергічних реакцій. Нерозчинні алергени (бактерії, спори грибів і ін.) Частіше призводять до алергічної реакції сповільненого типу. Розчинні алергени (антитоксичні сироватки, γ -глобуліни, продукти лізису бактерій і ін.), Особливо в великих кількостях, зазвичай викликають алергічну реакцію імунотоксичного типу.

Алерген, як причина алергічного захворювання, діє на організм в певних умовах, які можуть або сприяти його дії, що призведе до розвитку захворювання, або ускладнювати його дію і тим самим не допускати розвитку захворювання. Тому, незважаючи на наявність в навколишньому середовищі великої кількості потенційних алергенів, алергічні захворювання розвиваються тільки в певному відсотку випадків. Умови можуть бути зовнішніми (кількість алергену, тривалість і характер його дії) і внутрішніми. Внутрішні умови - це реактивність організму.

Реактивність організму - це властивість організму як цілого відповідати змінами життєдіяльності на вплив навколишнього середовища. Вона залежить від спадкових особливостей будови і функціонування систем організму і тих властивостей, які організм набуває в процесі свого життя. Ця сукупність вроджених (спадкових) і придбаних властивостей і являє ті внутрішні умови, від яких в

значній мірі залежить можливість розвитку або нерозвитку захворювання. Цей факт має велике значення, так як може цілеспрямовано змінювати реактивність організму в напрямку, що ускладнює реалізацію дії потенційних алергенів.

Встановлено, що імунна відповідь на кожен антиген визначена генетично. Від особливостей функціонування структурних генів імуноглобулінів залежать клас і типи антитіл, що утворюються. Спадкові або придбані дефекти в роботі деяких ланок імунної системи можуть сприяти розвитку алергічних реакцій.

4. Анафілактичний шок.

Є самим грізним алергічним ускладненням. Анафілактичний шок можуть викликати практично всі використовувані в даний час лікарські препарати, сироватки та вакцини, пилокві алергени, харчові продукти, особливо риба, молоко, яйця та інші, алкогольні напої, купання в холодній воді при холодової алергії, укуси ос, бджіл, джмелів, шершнів.

У патогенезі анафілактичного шоку розрізняють три стадії:

- ▶ імунологічну,
- ▶ патохімічну (біохімічну),
- ▶ і патофізіологічну.

1. Початковим етапом імунологічної стадії є сенсibiliзація, процес виникнення підвищеної чутливості, тобто утворення комплексу антиген-антитіло. В експерименті сенсibiliзація виникає приблизно протягом 7-8 днів, а у людини цей період може тривати багато місяців і років. Фаза сенсibiliзації характеризується виробленням специфічних антитіл - реактинів. Взаємодія алергену з антитілами відбувається в органах і клітинах, де знаходяться антитіла, тобто в шоківих органах. До цих органів належать шкіра, гладкі м'язи внутрішніх органів, клітини крові, нервова тканина, сполучна тканина.

2. Під час патохімічної стадії комплекс алерген-антитіло веде до придушення активності інгібіторів тканинних і сироваткових ферментів, що викликає інтоксикацію і появу біологічно активних речовин (гістаміну, серотоніну, гепарину, ацетилхоліну, брадикініну, і ін.).

3. Патофізіологічна стадія дає комплекс патофізіологічних розладів, що лежать в основі клінічної картини. Характерними є бронхоспазм, спазми гладких м'язів кишечника, сечового міхура, матки, порушення судинної проникності. У цю фазу відбувається і алергічне запалення, яке розвивається на шкірі, слизових оболонках і у внутрішніх органах.

Лікарський анафілактичний шок, як правило, розвивається у хворих, які приймали цей медикамент повторно, причому нерідко з алергічними ускладненнями, у осіб з лікарської сенсibiliзацією, що розвилася в результаті професійного контакту (медсестер, лікарів, фармацевтів та ін.), у хворих, що мають алергічні захворювання.

Швидкість виникнення ускладнення - *від декількох секунд або хвилин до 2-х ч.* Симптоми шоку різноманітні, ступінь вираженості їх варіює у різних хворих. За ступенем тяжкості ділиться на чотири стадії: легку, середньотяжку, важку і вкрай важку (смертельну). Більшість хворих скаржаться на раптову слабкість, задишку, запаморочення, зниження зору, втрату слуху, різкий свербіж шкіри або відчуття жару у всьому тілі, озноб, болі в животі, серце, нудоту, блювоту. Може наступити втрата свідомості.

Також відзначається тахікардія, ниткоподібний пульс, низький або зовсім невизначений артеріальний тиск, холодний піт, глухі тони серця, розширення зіниць, судоми, піна з рота, іноді різкий набряк язика, набряк обличчя, гортані.

Тривалість симптомів анафілактичного шоку залежить від ступеня сенсibiliзації, правильності і своєчасності лікування від супутніх захворювань і т.і. В одних випадках смерть хворих настає протягом 5-30 хв. від асфіксії, в інших - через 24-48 год. або кілька

днів від важких змін в нирках (за рахунок гломерулонефриту), печінки (гепатиту, некрозу печінки), шлунково-кишковому тракті (шлунково-кишкових кровотеч), серці (міокардиту) та інших органах.

До числа ускладнень анафілактичного шоку входять інфаркт, пневмонія, паралічі. Летальність при анафілактичному шоці коливається від 10 до 30%.

ЛЕКЦІЯ 13

ЗАСТОСУВАННЯ АНТИТІЛ В БІОЛОГІЇ І МЕДИЦИНІ

1. Шляхи зміцнення імунітету. Профілактична імунізація (вакцинація і ревакцинація)
2. Принципи постановки імунологічних реакцій *in vitro*.
 - 2.1. Загальний принцип отримання антитіл. Поняття ад'юванта.
 - 2.2. Отримання поліклональних антитіл і шляхи поліпшення їх якості.
 - 2.3. Технологія отримання моноклональних антитіл.

1. Шляхи зміцнення імунітету. Профілактична імунізація (вакцинація і ревакцинація)

У житті людини є кілька критичних етапів у розвитку здатності імунної системи здійснювати захист організму від чужорідних клітин і речовин. Ці етапи пов'язані з віковими змінами, під час яких імунна система поводить непередбачувано, коли впровадження антигену в організм викликає неправильну парадоксальну реакцію. Це виражається в тому, що імунна відповідь може виявитися або недостатньою для відбиття агресії чужорідного агента, або надмірною, що призводить до алергічних реакцій різного виду.

Першим періодом підвищеного ризику є перший місяць після народження. Дитина народжується практично «стерильною». Мікрофлора матері для нього не представляє небезпеки завдяки пасивному імунітету, який складається з захисних антитіл матері, отриманих дитиною через плаценту під час внутрішньоутробного розвитку і з молоком при грудному вигодовуванні. Мікроби, які є в пологовому будинку, становлять потенційну небезпеку для новонародженого, так як можливостей протистояти їм у нього мало. Власні антитіла його організм (імунна система) ще не виробляє, фагоцити недостатньо активні і т.д. Тому всі предмети, які стикаються з новонародженою дитиною, повинні бути практично стерильними. Якщо дитина народилася здоровою, то вона не повинна довго затримуватися в пологовому будинку або відділенні. Будинки новонародженого буквально атакує мікрофлора членів сім'ї і побутових предметів. На адаптацію до неї дитині потрібно не менше місяця. Однак вже до кінця першого тижня життя в його крові різко збільшується кількість лімфоцитів.

Другий період ослаблення захисних сил доводиться на 3-6-й місяці життя дитини. Це пов'язано з тим, що до цього періоду запас материнських антитіл, отриманих через плаценту, закінчується. Через це підвищується сприйнятливність організму до вірусів грипу, застуди і збудників дитячих інфекцій, які в цьому віці протікають нетипово і не дають стійкого імунітету. Дитині в цей період небажано контактувати з дітьми, які відвідують дитячий садок і школу. Дуже важливе тривале природне годування, так як через грудне молоко частково заповнюється недолік антитіл, здатних захистити його від інфекцій і вберегти від розвитку харчової алергії, яка найчастіше з'являється в ці місяці.

Третій період припадає на 2-й рік життя, коли розширюється коло контактів дитини з навколишнім середовищем, а місцевий імунітет слизових оболонок дихальної та травної систем ще не функціонує на повну силу, через що існує ризик повторних вірусних і бактеріальних інфекцій. Уникати їх допомагають загартовування, прогулянки на свіжому повітрі, правильне харчування. У цьому віці необхідно уникати відвідування з дитиною людних місць.

Четвертим періодом є 4-6-й роки життя малюка. Це так званий дошкільний період, коли дитина відвідує дитячий садок, в якому відбуваються постійні контакти з дітьми. У цьому віці часто розвивається хронічний тонзиліт, збільшуються аденоїди, бувають часті респіраторні інфекції, з'являється схильність до алергічних реакцій.

П'ятим періодом є підлітковий вік, що починається в 12-13 років у дівчаток і в 14-15 років у хлопчиків. Це час дуже бурхливого зростання і розвитку організму, за яким не встигають органи імунної системи. «Сплеск» статевих гормонів знижує активність Т-лімфоцитів і веде до підвищеного вироблення антитіл В-лімфоцитами. Це призводить до активізації запальних, хронічних і аутоімунних захворювань. У той же час в цей період відбувається полегшення перебігу алергічних захворювань, аж до їх повного зникнення. Необхідна санація усіх осередків хронічної інфекції (каріозних зубів, аденоїдів, хворих мигдалин і т. і.). Також важливим є правильне, збалансоване за всіма параметрами харчування. У всі періоди зростання і розвитку дитини кількість лікарських засобів, що застосовуються для лікування різних захворювань, має бути мінімальним. Одним з методів, що зміцнює імунну систему і попереджає деякі захворювання, є вакцинація.

Вакцинація - найефективніший метод захисту проти інфекційних захворювань, відомий в даний час. Основним принципом вакцинації є те, що пацієнтові вводиться ослаблений або вбитий хвороботворний агент для стимуляції вироблення антитіл, необхідних для боротьби зі збудником захворювання. Щеплення з успіхом застосовуються для боротьби з вірусами краснухи, кору, епідемічного паротиту, гепатиту В, поліомієліту, грипу або бактеріями (збудниками туберкульозу, дифтерії, коклюшу, правця). Суть вакцинації полягає в створенні або посиленні штучного імунітету. Існує поняття «колективного» імунітету. Чим більше людей мають імунітет до хвороби, тим менше ймовірність у неімунізованих захворіти і менше ризик виникнення епідемії (тобто за допомогою вакцинації створюється так звана імунний прошарок населення). Вакцинація буває як одноразового (від кору, паротиту), так і багаторазового (від поліомієліту АКДС). Кратність показує те, скільки разів необхідно ввести в організм вакцину для освіти імунітету.

Ревакцинація - це захід, спрямований на підтримку імунітету, який створений попередньої вакцинації. Зазвичай проводиться через кілька років після вакцинації. При виникненні осередкової спалаху якогось інфекційного захворювання для запобігання епідемії проводиться масова вакцинація. Вона являє собою одномоментну початкову вакцинацію, яка використовується для швидкого переривання ланцюга передачі інфекції. Прикладом такої вакцинації може служити масове охоплення щепленнями перед насувається епідемією грипу. Але у вакцинації є і недоліки. Вона проводиться тільки проти певних штамів, можлива неефективність внаслідок мутації вірусів.

Вакцини бувають різних видів:

- 1) живі вакцини, що містять ослаблений живий мікроорганізм;
- 2) інактивовані («убиті») вакцини;
- 3) хімічні вакцини. Вони містять компоненти клітинної стінки чи інших частин збудника;
- 4) анатоксини (містять неактивний токсин, продукувати бактеріями);
- 5) комбіновані вакцини (що містять кілька компонентів).

У иммунокоррекцію входить і застосування препаратів для відновлення порушеного імунітету. Це або монотерапія, або застосування імуномодуляторів за певною схемою. Для цього використовують препарати, які заміщають втрачену функцію імунітету (імуноглобуліни, інтерферони), і препарати, що стимулюють знижену функцію імунітету (індуктори інтерферонів, рослинні препарати, неспецифічні імуностимулятори). Універсальних засобів підвищення імунітету не існує. Імунна система організму людини дуже

складна, тому до питань зміцнення і корекції імунітету потрібно підходити розумно, комплексно і індивідуально, спираючись перш за все на пропаганду здорового способу життя. Це і повноцінне, збалансоване харчування, і загартовування організму, і відсутність стресів, і раціональний режим дня (робота, відпочинок, сон), і активний спосіб життя. Все це допоможе зміцнити імунітет і, отже, здоров'я організму.

Все сказане вище про імунітет і його механізми призвело до перегляду питання про роль імунітету в організмі. Захисна роль імунітету по відношенню до патогенних мікроорганізмів і їх токсинів є безсумнівною. Однак як пояснити відторгнення пересаджених гомологічних органів або еритроцитів несумісною групи крові того ж виду? Адже ці органи і клітини не містять токсинів, не несуть загрози макроорганізму, навпаки, вони рятують цей організм від загибелі. Відповідь на ці питання дає сучасна імунологія, яка за останні десятиліття радикально змінила своє утримання і розширила сферу інтересів. В даний час поняття імунітету означає здатність організму розпізнавати і знищувати чуже. При цьому під чужим розуміють не тільки патогенні мікроорганізми, токсини, перелита кров або трансплантат, а й мутантні клітини свого ж організму. Як би рідко не траплялися спонтанні мутації, макроорганізм, які складаються з 10^{13} клітин, значна частина яких постійно ділиться, може мати близько 10 млн мутантних клітин зі зміненим геномом. Деякі з них виявляються життєздатними і в процесі подальшого поділу утворюють тканину зі зміненою, невластивою організму функцією, що може привести до загибелі макроорганізму.

Таким чином, імунітет - це система захисних реакцій організму, спрямованих на підтримку генетичної сталості індивідуума. Що стосується трансплантаційного імунітету, то він є зворотним і вкрай небажаним аспектом цього процесу, з яким доводиться боротися заради порятунку життя людини.

2. Принципи постановки імунологічних реакцій *in vitro*.

У сучасній біології та медицині імуноглобуліни є невід'ємними учасниками досліджень на клітинному і молекулярному рівнях. Їх широке застосування базується на високій специфічності взаємодії з антигенами, точніше, з окремими антигенними детермінантами. Фактично за допомогою антитіл вдається виявляти відмінності не тільки клітин по їх поверхневих антигенів, але і окремих молекул друг від друга. Більш того, із застосуванням імуноглобулінів можливо виявляти присутність конкретних клітин або молекул в аналізованих субстанціях та отримувати їх для дослідження в чистому вигляді. Умовно кажучи, навіть найсучасніші фізичні і хімічні методи дослідження клітин і складних органічних молекул програють імунологічних методів по роздільній здатності і простоті їх реалізації. Відображенням ролі і значення імуноглобулінів в сучасних наукових дослідженнях і біотехнологічних виробництвах є присудження Нобелівської премії за розробку гібридомної технології, за допомогою якої вдається отримувати суспензії високоспецифічних антитіл.

До появи гібридомних технологій єдиним джерелом антитіл для проведення імунологічних реакцій були вищі тварини. Найчастіше для цих цілей використовуються так звані лабораторні тварини (кролики або миші), але коли потрібні значні обсяги сироваток, перевага віддається рогатій худобі або коням.

2.1. Загальний принцип отримання антитіл. Поняття ад'юванта.

Загальний принцип отримання антитіл в організмі тварин заключається в так званій імунізації їх конкретним антигеном. Для цього суспензію антигену вводять у внутрішнє середовище тваринного за допомогою шприца, використовуючи різні методи введення

(внутрішньом'язово, підшкірно, внутрішньошкірно і ін.). Концентрації, розчинники, що вводяться дози і час їх введення підбираються з урахуванням особливостей імунізуючий виду тварин і з конкретною метою викликати максимально високу продукцію антитіл, специфічних до антигенних детермінантам вводимо антигену. Знаючи про те, що вторинна імунна відповідь дає більш високий титр антитіл і специфічність їх буде вищою, антиген, як правило, вводять кілька разів протягом 4-5 тижнів. Після досягнення передбачуваного часу максимального вираження вторічного імунної відповіді відбирають невелику кількість крові тваринної, отримують сироватку (тобто звільняють кров від формених елементів і фібриногену) і визначають кількість потрібних антитіл шляхом титрування сироватки. Якщо титр визнається задовільним, тварина знекровлюють і отримують максимальну кількість сироватки.

Для отримання максимально високого титру антитіл антиген, найчастіше, вводять спільно з **ад'ювантами** - факторами різного походження та складу, стимулюючими діяльність імунної системи. До теперішнього часу відомо, що ад'ювантна властивостями володіють:

- ▶ позбавлені життєздатності клітини різних мікроорганізмів (мікобактерій, коринебактерій та ін.),
- ▶ окремі фракції зруйнованих бактеріальних клітин (найчастіше полісахариди або ліпополісахариди),
- ▶ деякі органічні (агар-агар, крохмаль, пектини, желатин, лецитин, ланолін, гліцерин і ін.) І неорганічні (мінеральні масла, амонієво-кальцієві галун, гідроксиди алюмінію або заліза, фосфати алюмінію або кальцію, хлорид кальцію і ін.)
- ▶ речовини природного походження, а також синтетичні молекули (олігонуклеотиди, поліаніонну та ін.).

Здатність виступати в якості ад'ювантів для переважної більшості застосовуваних в такій якості речовин була визначена емпірично, оскільки механізм впливу ад'ювантов досі обговорюється лише може бути. Одне з припущень базується на те, що багато ад'юванти мають здатність неспецифічно сорбувати молекули і одночасно є речовинами, погано метаболізуються у внутрішньому середовищі організму ссавців (наприклад, полісахариди рослинного походження з великою молекулярною масою з органічних ад'ювантів або амонієво -кальцієві галун з неорганічних). Вважається, що подібні з'єднання можуть поступово, протягом тривалого часу звільняти введений разом з ними антиген. Така дія часто називають ефектом депо, тобто ад'ювант депонує антиген, а потім багаторазово представляє його імунній системі, забезпечуючи тим самим послідовний розвиток декількох імунних відповідей на нього. Передбачається також, антигени, що мають невелику молекулярну масу об'єднуються з макромолекулами ад'юванта в комплексні антигени, внаслідок чого більш ефективно впізнаються імунною системою.

Ад'юванти прийнято ділити на прості і складні виходячи з того, одна це речовина або суміш декількох речовин. У практиці в залежності від ситуацій використовуються прості і складні ад'юванти, але найбільш відомими і широко вживаними для отримання імунних сироваток є повний і неповний ад'юванти Фрейнда. Неповний варіант цього ад'юванта включає ліпополісахариди *Mycobacterium tuberculosis*, ланолін (він же вовняний віск), вазелінове масло, емульгатори Твін-80. Повним такий ад'ювант стає при додаванні культури БЦЖ (BCG, від *bacillus Calmette-Guerin* - бацила Кельмета-Герена), яка застосовується в якості живого вакцинного препарату для профілактики туберкульозу. Обидва варіанти виробляються промислово і поставляються в лабораторії, де здійснюється імунізація з метою отримання сироваток.

Слід зазначити, що неспецифічне стимулювання імунної системи ад'ювантами знаходить застосування і в профілактиці інфекційних захворювань. Багато хімічних вакцинних препаратів виробляють сорбованими на гідроксиде або фосфаті алюмінію не тільки для кращого зберігання, але й для надання їм здатності додатково стимулювати імунну систему. Вважається також, що більш тривалий і ефективний штучний


активний імунітет після застосування живих або убитих вакцин в порівнянні з деякими хімічними є наслідком наявності в складі перших бактеріальних ліпополісахаридів і нуклепротеїдів, що володіють ад'ювантними властивостями.

2.2. Отримання поліклональних антитіл і шляхи поліпшення їх якості

Отримані шляхом імунізації тварин суспензії антитіл в теперешній час називають поліклональних антитіл. Дійсно, знаючи про те, як саме подається полівалентний антиген імунної системи можна припускати, що в організмі формується множина клонів плазматичних клітин. Для захисту організму від даного антигену така відповідь є найбільш вигідною і ефективною, однак для застосування таких антитіл в реакціях *in vitro* їх різноманіття може бути небажаним. Зокрема, відомо, що багато близькоспорінених бактерій володіють практично однаковими антигенами або антигенними детермінантами. Це призводить до так званих перехресних реакцій, коли аглютинати або преципитати утворюються при змішуванні поліклональних антитіл з антигенами (клітинами або молекулами), що не використалися для імунізації тварини. Звичайно, що при застосуванні таких сироваток для ідентифікації виділеного антигену (наприклад, конкретних хвороботворних бактерій) або виявлення його в досліджуваному матеріалі перехресні реакції явно небажані.

У зв'язку з цим ще на зорі застосування сироваток для ідентифікації бактерій і діагностики інфекційних захворювань був запропонований та до сих пір використовується метод поліпшення їх якості. Так звані моноспецифічні сироватки або, як їх зазвичай називають досі, антисироватки («анти» в даному контексті означає «проти конкретного антигену», наприклад, антисироватка холерна, що дозволяє відрізнити холерного вібріона від інших бактерій) отримують шляхом виснаження. Для цього сироватку змішують з антигеном, який дає небажану перехресну реакцію, в умовах, що забезпечують взаємодію антиген-антитіло, і отримані комплекси відокремлюють від розчину, наприклад центрифугуванням. Антитіл в сироватці стає менше (вона виснажується), але за рахунок адсорбції антигеном специфічність сироватки по відношенню до потрібного антигену зростає. Використовуючи за такою схемою послідовно кілька споріднених антигенів, можна досягти потрібного рівня специфічності сироватки.

Однак при виснаженні на кожному етапі відбувається зменшення загального обсягу сироватки при видаленні одержуваних опадів, тому адсорбцію зазвичай проводять лише кілька разів. Крім того, такий прийом не звільняє сироватку від інших, так званих баластних, антитіл. У зв'язку з цим з появою в хімії колоночної афінної хроматографії був розроблений метод отримання суспензій антитіл однакової специфічності з поліклональних сироваток (мал. 20). Основою методу є оборотність реакцій антиген-антитіло. Хроматографічну колонку заповнюють гранулами речовини, яка не сорбує білки, з яким ковалентно пов'язані молекули конкретного антигену. Потім через колонку пропускають розчин електrolітів, що забезпечує умови зв'язування антигенів і антитіл і далі суміш такого розчину з сироваткою. По мірі проходження через колонку на речовині, що її заповнює будуть осідати тільки специфічні по відношенню до вибраного антигену антитіла. Після проходження всього обсягу розчину, що містить сироватку, колонку промивають декількома об'ємами вихідного розчину електrolітів для повного видалення всіх незв'язаних антитіл. Останнім етапом є пропускання через колонку розчину, який викликає дисоціацію комплексів антиген-антитіло, що призводить до елюції (змивання) потрібних антитіл. Виходячу з колонки суспензію збирають і використовують для постановки реакцій.



Мал. 20. Виділення антитіл потрібної специфічності за допомогою афінної хроматографії (А.Г.Песнякевич, 2007)

Недоліками такого методу є невелика кількість потрібних антитіл, одержуваних з значних обсягів сироватки, і відсутність повної ідентичності антитіл, відібраних таким методом. Останнє пов'язано з тим, що при використанні полівалентного антигену в суспензії виявляються антитіла, специфічні по відношенню до різних антигенних детермінант цього антигену, оскільки при імунній відповіді організму утворювалися різні клони плазматичних клітин. Інакше кажучи, така суспензія, хоча і буде високоспецифічною, залишиться все одно поліклональною.

2.3. Технологія отримання моноклональних антитіл.

Подолати це вдалося в результаті розробки **технології створення клітин, придатних для отримання моноклональних антитіл**. Основою для такого підходу стало розуміння того, що конкретні В-лімфоцити індивідуальні за своїми клітинними рецепторами для антигену і що після їх активації Т-клітинами вони дають клон плазматичних клітин, що утворюють антитіла тільки однієї специфічності. Тобто, якщо відібрати один з таких, що дає потрібні антитіла, В-лімфоцитів і розмножувати його поза організмом, можна буде отримувати ідентичні по антигензв'язуючих ділянок антитіла. Основною проблемою на шляху втілення такого теоретичного підходу в життя стала відсутність у клітин ссавців здатності розмножуватися поза організмом, на штучних поживних середовищах. Вирішити цю проблему змогли Г. Келлер і Ц. Мілшштейн (Нобелівська премія 1984 року).

На відміну від звичайних клітин ссавців злоякісно змінені (ракові) клітини мають здатність тривалий час (в спеціальних умовах нескінченно довго) ділитися на поживних середовищах. Серед ракових захворювань є і такі, які є наслідком злоякісної зміни клітин червоного кісткового мозку - множинної мієломи. Одним із симптомів цієї хвороби є накопичення в крові білків глобулінової фракції, які представляють собою однорідні за


складом імуноглобуліни. Саме від таких хворих були виділені злякано змінені здатні до продукції антитіл В-лімфоцити (їх називають плазмоцитоми - від плазматична клітина), які можуть довго розмножуватися в культурі. Згодом був знайдений спосіб викликати множинну мієлому червоного кісткового мозку у лабораторних тварин (зокрема, білих мишей і щурів) і були отримані лінії мієломних В-клітин різного походження.

Крім того, вже існувала методика так званої соматичної гібридизації клітин тварин - злиття під впливом діючих на біологічні мембрани хімічних речовин, наприклад, поліетиленгліколю.

Спираючись на ці факти, Келлер і Мільштейн поставили за мету домогтися об'єднання властивостей мієломних і звичайних В-клітин шляхом їх злиття. Головним завданням при досягненні цієї мети став підбір умов, що дозволяють відібрати потрібні продукти злиття, так звані гібридоми. Для цього були використані клітини мутантних плазмоцидів, у яких були відсутні ферменти шляхів біосинтезу азотистих основ.

Фактично головним досягненням Келлера і Мільштейна стало використання середовища, що містить гіпоксантин, аміноптерин і тимидин (скорочено ДАТ-середовища), що дозволяє відібрати потрібні продукти злиття. Запропонована ними схема відбору гібридів, придатних для отримання моноклональних антитіл, представлена на мал. 21.

Першим етапом є імунізація тварини (наприклад, білої миші) тим антигеном, до якого необхідно отримати моноклональні антитіла. Після розвитку імунної відповіді (що контролюється по появі в сироватці крові тварини антитіл до вибраного антигену) з селезінки тварини відбирають лімфоцити, змішують з суспензією ДАТ-чутливих мієломних клітин миші, додають речовину, що сприяє злиттю клітин (наприклад, поліетиленгліколь) і витримують необхідний для злиття час. Потім отриману суміш висівають на ДАТ-середу.



Мал. 21. Схема отримання моноклональних антитіл (А.Г.Песнякевич, 2007)

Оскільки злиття відбувається неконтрольовано, в суміші можуть міститися різні злиті і не злиті лімфоцити. До розмноження на ДАТ-середовищі виявляються здатними тільки представники однієї групи з присутніх в суміші клітин. У ній виявляються такі об'єднані клітини, нащадки яких успадкують від мієломної клітини здатність постійно ділитися, а від нормального, не ракового, В-лімфоциту- нечутливість до ДАТ-середовища.

Сформовані клони перевіряють на здатність продукувати антитіла і відбирають ті з них, які дають антитіла до використаного для імунізації тваринного антигену.

Отримані стабільні, які не дають розщеплення клони, є джерелом гібридів, придатних для отримання абсолютно однорідних по специфічності антитіл, які і називають моноклональними. Напрацювання потрібної кількості антитіл здійснюють або спонукаючи гібридомну клітину до продукції антитіл в культурі, або вводячи суспензію таких гібридів в організм спеціально підготовлених лабораторних тварин.

Переваги моноклональних антитіл підтверджені вже понад тридцятирічним досвідом їх застосування в різних областях біології і медицини. Завдяки використанню таких імуноглобулінів вдалося виявити і отримати в придатній для дослідження кількості і вигляді багато речовин, які не можуть бути виявленими іншими методами. В теперешній час моноклональні антитіла все ширше використовуються в масштабному промисловому виробництві високочистих препаратів для наукових і медичних цілей. Здійснювана з їх допомогою афінна хроматографія дозволяє досягати максимально високого ступеню гомогенності вироблених речовин. На основі моноклональних антитіл розроблені спеціальні діагностичні набори, що дозволяють ідентифікувати збудників інфекційних захворювань, а також антигени, що з'являються в організмі при різних патологіях неінфекційної природи.

В даний час існує безліч ліній мієломних ДАТ-чутливих В-лімфоцитів, що ведуть своє походження від ссавців різних видів. Відпрацьовано також методи виділення В-лімфоцитів не з селезінки, а з так званої периферичної крові, відібраної з судин імунізованого організму стандартними методами, що дозволяє отримувати гібридами і, відповідно, моноклональні антитіла, різної видової приналежності, включаючи людські. Це відкриває можливості для терапії ряду захворювань, наприклад, злоякісних змін, шляхом доставки пов'язаних з моноклональними антитілами лікарських препаратів безпосередньо до ракових клітин без спричинення шкоди іншим клітинам організму.

- 2) Питання, задачі, завдання або кейси для поточного та підсумкового контролю: -
- 3) Завдання для комплексної контрольної роботи (ККР) / Завдання (інструменти) для оцінки результатів навчання з даного предмету

1. Історія розвитку імунології як науки
2. Функції імунної системи
3. Первинні органи імунної системи
4. Вторинні органи імунної системи
5. Шкіра та епітеліальні тканини як компоненти імунної системи
6. Загальна характеристика клітин імунної системи
7. Загальна характеристика лімфоцитів
8. Нормальні (природні) кілери
9. Загальна характеристика гранулоцитів
10. Хімічна будова молекул імуноглобулінів
11. Функції окремих ділянок (доменів) молекули імуноглобулінів
12. Класифікація і функції окремих класів імуноглобулінів - Імуноглобуліни класу G (IgG)
13. Класифікація і функції окремих класів імуноглобулінів - Імуноглобуліни класу G (IgM)
14. Класифікація і функції окремих класів імуноглобулінів - Імуноглобуліни класу G (IgA)
15. Класифікація і функції окремих класів імуноглобулінів - Імуноглобуліни класу G (IgE)
16. Класифікація і функції окремих класів імуноглобулінів - Імуноглобуліни класу G (IgD)
17. Поняття про неспецифічний (природжений) імунітет, його компонентах і їх функцій
18. Поняття про специфічний (гуморальний, лімфоїдний) імунітет
19. Загальна характеристика механізмів неспецифічного (вродженого) імунітету
20. Фагоцитоз і його фази
21. Позаклітинне знищення (цитотоксичність) - макрофаги і нормальні кілери (НК)
22. Компоненти системи комплементу і загальні механізми її активації
23. Альтернативний шлях активації комплементу

24. Класичний шлях активації комплементу
25. Загальна характеристика інтерферонів, білків гострої фази, лізоциму, фібронектину, катіонних білків як компонентів системи комплементу
26. Характеристика клітин, що беруть участь в реакціях специфічного імунітету
27. Механізми реакції антиген-антитіло
28. Поняття терміна антиген, його загальна будова. Імуногенність ліпідів, вуглеводів, нуклеїнових кислот і білків
29. Класифікація антигенів
30. Характеристика імунних реакцій
31. Поняття вродженого і набутого імунітету
32. Поняття природного та штучного імунітету. Види вакцин і вакцинних препаратів
33. Поняття імунного статусу і його основні характеристики
34. Вроджені імунодефіцити
35. Придбані імунодефіцити
36. Аутоімунні захворювання
37. СНІД
38. Поняття про алергію, механізм розвитку алергічних реакцій, причини збільшення алергічних реакцій
39. Загальна етіологія алергічних захворювань. Класифікація алергенів і їх характеристика
40. Патогенез алергічних процесів. Класифікація алергічних реакцій
41. Анафілактичний шок
42. Шляхи зміцнення імунітету. Профілактична імунізація (вакцинація і ревакцинація)